

K8g Au cours des 12 derniers mois, fréquence de consommation de : Autres drogues ou médicaments pris sans prescription pour avoir un effet (valium, librium, dalmane, halcion, activan, ritalin, etc.)

p = 0,269		Sexe		Total
		Garçon	Fille	
K8g Au cours des 12 derniers mois, fréquence de consommation de : Autres drogues ou médicaments pris sans prescription pour avoir un effet (valium, librium, dalmane, halcion, activan, ritalin, etc.)	1 Je n'ai pas consommé	400 97,1%	663 98,4%	1063 97,9%
	2 Juste une fois pour essayer	5 1,2% **	8 1,2% **	13 1,2% **
	3 Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	5 1,2% **	2 ,3% **	7 ,6% **
	4 Environ une fois par mois	1 ,2% **	0 ,0% **	1 ,1% **
	7 Tous les jours	1 ,2% **	1 ,1% **	2 ,2% **
Total		412 100,0%	674 100,0%	1086 100,0%

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
96,1%	98,1%	97,8%	99,0%	97,4%	98,4%	0,033
0,5%	1,9%	0,7%	1,7%	0,8%	1,6%	0,950
0,5%	1,9%	NA	NA	0,3%	0,9%	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

K8aR Fréquence de consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois - Recodée

p = 0,002		Sexe		Total
		Garçon	Fille	
K8aR Fréquence de consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois - Recodée	1 Jamais	246 59,3%	434 63,4%	680 61,8%
	2 Moins d'une fois/mois	91 21,9%	171 25,0%	262 23,8%
	3 Environ une fois/mois	23 5,5% *	35 5,1% *	58 5,3%
	4 Au moins une fois/sem.	55 13,3%	45 6,6%	100 9,1%
Total		415 100,0%	685 100,0%	1100 100,0%

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
56,3%	62,2%	61,2%	65,5%	60,1%	63,6%	0,030
19,4%	24,4%	23,0%	26,9%	22,3%	25,4%	0,061
4,2%	6,9%	4,1%	6,1%	4,5%	6,1%	0,618
11,2%	15,3%	5,4%	7,7%	8,0%	10,1%	0,000

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

K8bR Fréquence de consommation de cocaïne au cours des 12 derniers mois - Recodée

p = 0,274		Sexe		Total
		Garçon	Fille	
K8bR Fréquence de consommation de cocaïne au cours des 12 derniers mois - Recodée	1 Jamais	398 96,1%	672 98,0%	1070 97,3%
	2 Moins d'une fois/mois	14 3,4% **	11 1,6% **	25 2,3% *
	3 Environ une fois/mois	1 ,2% **	1 ,1% **	2 ,2% **
	4 Au moins une fois/sem.	1 ,2% **	2 ,3% **	3 ,3% **
Total		414 100,0%	686 100,0%	1100 100,0%

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
95,0%	97,3%	97,3%	98,6%	96,7%	97,9%	0,007
2,3%	4,5%	1,0%	2,2%	1,7%	2,8%	0,005
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

K8cR Fréquence de consommation de colle ou solvant au cours des 12 derniers mois - Recodée

p = 0,199		Sexe		Total
		Garçon	Fille	
K8cR Fréquence de consommation de colle ou solvant au cours des 12 derniers mois - Recodée	1 Jamais	405 97,8%	679 99,1%	1084 98,6%
	2 Moins d'une fois/mois	7 1,7% **	5 ,7% **	12 1,1% **
	4 Au moins une fois/sem.	2 ,5% **	1 ,1% **	3 ,3% **
Total		414 100,0%	685 100,0%	1099 100,0%

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
96,9%	98,7%	98,7%	99,5%	98,2%	99,1%	0,009
0,9%	2,5%	0,3%	1,1%	0,7%	1,5%	0,030
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

K8dR Fréquence de consommation d'hallucinogènes au cours des 12 derniers mois - Recodée

Croisement				
		Sexe		Total
		Garçon	Fille	
p = 0,591				
K8dR Fréquence de consommation d'hallucinogènes au cours des 12 derniers mois - Recodée	1 Jamais	365 88,2%	620 90,8%	985 89,8%
	2 Moins d'une fois/mois	43 10,4%	54 7,9%	97 8,8%
	3 Environ une fois/mois	3 ,7% **	5 ,7% **	8 ,7% **
	4 Au moins une fois/sem.	3 ,7% **	4 ,6% **	7 ,6% **
Total		414 100,0%	683 100,0%	1097 100,0%

Intervalle de confiance						
Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
86,2%	90,1%	89,5%	92,1%	88,7%	90,9%	0,030
8,5%	12,2%	6,7%	9,1%	7,8%	9,9%	0,028
NA	NA	0,3%	1,1%	0,4%	1,0%	NA
NA	NA	NA	NA	0,3%	0,9%	NA

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

K8eR Fréquence de consommation d'héroïne au cours des 12 derniers mois - Recodée

Croisement				
		Sexe		Total
		Garçon	Fille	
p = 1,000				
K8eR Fréquence de consommation d'héroïne au cours des 12 derniers mois - Recodée	1 Jamais	411 99,5%	679 99,4%	1090 99,5%
	2 Moins d'une fois/mois	2 ,5% **	3 ,4% **	5 ,5% **
	4 Au moins une fois/sem.	0 ,0% **	1 ,1% **	1 ,1% **
Total		413 100,0%	683 100,0%	1096 100,0%

Intervalle de confiance						
Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
NA	NA	NA	NA	99,2%	99,7%	NA
NA	NA	NA	NA	0,2%	0,7%	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

K8fR Fréquence de consommation d'amphétamines au cours des 12 derniers mois - Recodée

		Croisement		Total
		Sexe		
		Garçon	Fille	
p = 0,856				
K8fR Fréquence de consommation d'amphétamines au cours des 12 derniers mois - Recodée	1 Jamais	381 91,8%	619 90,8%	1000 91,2%
	2 Moins d'une fois/mois	30 7,2% *	54 7,9%	84 7,7%
	3 Environ une fois/mois	3 ,7% **	8 1,2% **	11 1,0% **
	4 Au moins une fois/sem.	1 ,2% **	1 ,1% **	2 ,2% **
Total		415 100,0%	682 100,0%	1097 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
90,2%	93,5%	89,4%	92,1%	90,1%	92,2%	0,333
5,7%	8,8%	6,7%	9,2%	6,7%	8,6%	0,497
NA	NA	0,7%	1,7%	0,6%	1,4%	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

K10 As-tu déjà consommé de la drogue de façon régulière, c'est-à-dire au moins une fois par semaine pendant au moins un mois?

		Croisement		Total
		Sexe		
		Garçon	Fille	
p = 0,200				
K10 As-tu déjà consommé de la drogue de façon régulière, c'est-à-dire au moins une fois par semaine pendant au moins un mois?	1 Oui	73 17,6%	100 14,6%	173 15,7%
	2 Non	342 82,4%	584 85,4%	926 84,3%
Total		415 100,0%	684 100,0%	1099 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
15,3%	19,9%	13,0%	16,2%	14,4%	17,1%	0,037
80,1%	84,7%	83,8%	87,0%	82,9%	85,6%	0,037

K13a Au cours des 12 derniers mois : J'ai eu des difficultés psychologiques à cause de ma consommation d'alcool ou de drogues.

Croisement

		Sexe		Total
		Garçon	Fille	
p = 0,025				
K13a Au cours des 12 derniers mois : J'ai eu des difficultés psychologiques à cause de ma consommation d'alcool ou de drogues.	1 Oui	24 5,8% *	20 2,9% *	44 4,0%
	2 Non	389 94,2%	663 97,1%	1052 96,0%
Total		413 100,0%	683 100,0%	1096 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
4,4%	7,2%	2,2%	3,7%	3,3%	4,7%	0,000
92,8%	95,6%	96,3%	97,8%	95,3%	96,7%	0,000

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

K13b Au cours des 12 derniers mois : Ma consommation d'alcool ou de drogues a nuit à mes relations avec ma famille.

Croisement

		Sexe		Total
		Garçon	Fille	
p = 0,014				
K13b Au cours des 12 derniers mois : Ma consommation d'alcool ou de drogues a nuit à mes relations avec ma famille.	1 Oui	26 6,3% *	21 3,1% *	47 4,3%
	2 Non	387 93,7%	661 96,9%	1048 95,7%
Total		413 100,0%	682 100,0%	1095 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
4,8%	7,8%	2,3%	3,9%	3,6%	5,0%	0,000
92,2%	95,2%	96,1%	97,7%	95,0%	96,4%	0,000

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

K13c Au cours des 12 derniers mois : Ma consommation d'alcool ou de drogues a nuit à une de mes amitiés ou à ma relation amoureuse.

Croisement

		Sexe		Total
		Garçon	Fille	
p = 0,202				
K13c Au cours des 12 derniers mois : Ma consommation d'alcool ou de drogues a nuit à une de mes amitiés ou à ma relation amoureuse.	1 Oui	26 6,3% *	30 4,4% *	56 5,1%
	2 Non	385 93,7%	651 95,6%	1036 94,9%
Total		411 100,0%	681 100,0%	1092 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
4,8%	7,8%	3,5%	5,3%	4,3%	5,9%	0,032
92,2%	95,2%	94,7%	96,5%	94,1%	95,7%	0,032

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

K13d Au cours des 12 derniers mois : J'ai eu des difficultés dans mes cours à cause de ma consommation d'alcool ou de drogues.

Croisement

		Sexe		Total
		Garçon	Fille	
p = 0,000				
K13d Au cours des 12 derniers mois : J'ai eu des difficultés dans mes cours à cause de ma consommation d'alcool ou de drogues.	1 Oui	24 5,8% *	11 1,6% **	35 3,2% *
	2 Non	390 94,2%	673 98,4%	1063 96,8%
Total		414 100,0%	684 100,0%	1098 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
4,4%	7,2%	1,0%	2,2%	2,5%	3,8%	0,000
92,8%	95,6%	97,8%	99,0%	96,2%	97,5%	0,000

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

K13e Au cours des 12 derniers mois : J'ai commis un geste délinquant (même si je n'ai pas été arrêté par la police) alors que j'avais consommé de l'alcool ou de la drogue.

Croisement

		Sexe		Total
		Garçon	Fille	
p = 0,002				
K13e Au cours des 12 derniers mois : J'ai commis un geste délinquant (même si je n'ai pas été arrêté par la police) alors que j'avais consommé de l'alcool ou de la drogue.	1 Oui	39 9,4% *	32 4,7% *	71 6,5%
	2 Non	375 90,6%	651 95,3%	1026 93,5%
Total		414 100,0%	683 100,0%	1097 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
7,7%	11,2%	3,7%	5,6%	5,6%	7,4%	0,000
88,8%	92,3%	94,4%	96,3%	92,6%	94,4%	0,000

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

K13f Au cours des 12 derniers mois : J'ai l'impression que les mêmes quantités d'alcool ou de drogues ont maintenant moins d'effet sur moi.

Croisement

		Sexe		Total
		Garçon	Fille	
p = 0,010				
K13f Au cours des 12 derniers mois : J'ai l'impression que les mêmes quantités d'alcool ou de drogues ont maintenant moins d'effet sur moi.	1 Oui	59 14,3%	62 9,1%	121 11,0%
	2 Non	355 85,7%	621 90,9%	976 89,0%
Total		414 100,0%	683 100,0%	1097 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
12,1%	16,4%	7,8%	10,4%	9,9%	12,2%	0,000
83,6%	87,9%	89,6%	92,2%	87,8%	90,1%	0,000

K13g Au cours des 12 derniers mois : J'ai parlé de ma consommation d'alcool ou de drogues à un intervenant.

Croisement

		Sexe		Total
		Garçon	Fille	
p = 0,256				
K13g Au cours des 12 derniers mois : J'ai parlé de ma consommation d'alcool ou de drogues à un intervenant.	1 Oui	7 1,7% **	6 ,9% **	13 1,2% **
	2 Non	406 98,3%	677 99,1%	1083 98,8%
Total		413 100,0%	683 100,0%	1096 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
0,9%	2,5%	0,5%	1,3%	0,8%	1,6%	0,072
97,5%	99,1%	98,7%	99,5%	98,4%	99,2%	0,072

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

D2D3IMCRec Classes de l'indice de masse corporelle (IMC) selon les points de coupure de Santé Canada

Croisement

p = 0,184		Sexe		Total
		Garçon	Fille	
D2D3IMCRec Classes de l'IMC selon Santé Canada	1 Poids insuffisant	39 9,4% *	75 11,0%	114 10,4%
	2 Poids normal	306 73,7%	520 76,4%	826 75,4%
	3 Excès de poids	52 12,5%	66 9,7%	118 10,8%
	4 Obésité, classe I	13 3,1% **	16 2,3% *	29 2,6% *
	5 Obésité, classe II	1 ,2% **	3 ,4% **	4 ,4% **
	6 Obésité, classe III	4 1,0% **	1 ,1% **	5 ,5% **
Total		415 100,0%	681 100,0%	1096 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
7,6%	11,2%	9,6%	12,4%	9,3%	11,5%	0,162
71,1%	76,4%	74,4%	78,3%	73,8%	76,9%	0,118
10,5%	14,5%	8,3%	11,0%	9,6%	11,9%	0,021
2,1%	4,2%	1,7%	3,0%	2,1%	3,2%	0,222
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	0,2%	0,7%	NA

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

D4a Chiffre correspondant le mieux à ton apparence actuelle (silhouette actuelle).

Croisement

p = 0,000		Sexe		Total
		Garçon	Fille	
D4a Chiffre correspondant le mieux à ton apparence actuelle.	Silhouette 1	0 0,0% **	9 1,3% **	9 0,8% **
	Silhouette 2	6 1,4% **	44 6,3%	50 4,5%
	Silhouette 3	40 9,4% *	124 17,8%	164 14,6%
	Silhouette 4	92 21,6%	192 27,6%	284 25,3%
	Silhouette 5	156 36,7%	153 22,0%	309 27,6%
	Silhouette 6	81 19,1%	106 15,2%	187 16,7%
	Silhouette 7	38 8,9% *	39 5,6% *	77 6,9%
	Silhouette 8	11 2,6% **	23 3,3% *	34 3,0% *
	Silhouette 9	1 0,2% **	6 0,9% **	7 0,6% **
Total		425 100,0%	696 100,0%	1121 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
NA	NA	0,8%	1,8%	0,5%	1,1%	NA
0,7%	2,1%	5,2%	7,4%	3,7%	5,2%	0,000
7,7%	11,1%	16,1%	19,5%	13,4%	15,9%	0,000
19,2%	24,1%	25,6%	29,6%	23,8%	26,9%	0,000
33,9%	39,5%	20,1%	23,8%	26,0%	29,1%	0,000
16,8%	21,4%	13,6%	16,8%	15,4%	18,0%	0,007
7,3%	10,6%	4,6%	6,6%	6,0%	7,8%	0,001
1,7%	3,5%	2,5%	4,1%	2,4%	3,6%	0,250
NA	NA	0,5%	1,3%	0,3%	0,9%	NA

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

D4b Chiffre correspondant le mieux à comment tu aimerais être (silhouette souhaitée).

Croisement

		Sexe		Total
		Garçon	Fille	
p = 0,000				
D4b Chiffre correspondant le mieux à comment tu aimerais être.	Silhouette 1	4 ,9% **	13 1,9% **	17 1,5% *
	Silhouette 2	0 ,0% **	98 14,1%	98 8,8%
	Silhouette 3	15 3,5% **	245 35,4%	260 23,3%
	Silhouette 4	30 7,1% *	221 31,9%	251 22,5%
	Silhouette 5	268 63,4%	92 13,3%	360 32,3%
	Silhouette 6	101 23,9%	24 3,5% *	125 11,2%
	Silhouette 7	3 ,7% **	0 ,0% **	3 ,3% **
	Silhouette 9	2 ,5% **	0 ,0% **	2 ,2% **
	Total	423 100,0%	693 100,0%	1116 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
NA	NA	1,3%	2,5%	1,1%	2,0%	NA
NA	NA	12,6%	15,7%	7,8%	9,8%	NA
2,5%	4,6%	33,2%	37,5%	21,8%	24,8%	0,000
5,6%	8,6%	29,8%	34,0%	21,0%	24,0%	0,000
60,5%	66,2%	11,8%	14,8%	30,6%	33,9%	0,000
21,4%	26,4%	2,6%	4,3%	10,1%	12,3%	0,000
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

IndD4 Indice d'insatisfaction de l'image corporelle (différence entre la silhouette actuelle et la silhouette souhaitée)

		Croisement		
		Sexe		Total
p = 0,000		Garçon	Fille	
IndD4 Indice d'insatisfaction de l'image corporelle	-7	0 ,0% **	3 ,4% **	3 ,3% **
	-6	0 ,0% **	1 ,1% **	1 ,1% **
	-5	0 ,0% **	4 ,6% **	4 ,4% **
	-4	0 ,0% **	8 1,2% **	8 ,7% **
	-3	8 1,9% **	45 6,6%	53 4,8%
	-2	17 4,0% *	134 19,5%	151 13,6%
	-1	93 22,0%	251 36,5%	344 31,0%
	0 Satisfaits	169 40,0%	215 31,3%	384 34,6%
	1	95 22,5%	22 3,2% *	117 10,6%
	2	31 7,3% *	4 ,6% **	35 3,2% *
	3	7 1,7% **	0 ,0% **	7 ,6% **
5	2 ,5% **	0 ,0% **	2 ,2% **	
Total		422 100,0%	687 100,0%	1109 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	0,7%	1,6%	0,4%	1,0%	NA
1,1%	2,7%	5,4%	7,7%	4,0%	5,5%	0,000
2,9%	5,2%	17,7%	21,3%	12,4%	14,8%	0,000
19,6%	24,5%	34,4%	38,7%	29,4%	32,7%	0,000
37,2%	42,9%	29,2%	33,4%	32,9%	36,3%	0,000
20,1%	25,0%	2,4%	4,0%	9,4%	11,7%	0,000
5,8%	8,9%	NA	NA	2,5%	3,8%	NA
0,9%	2,4%	NA	NA	0,3%	0,9%	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

IndD4R Indice d'insatisfaction de l'image corporelle - recodé

Croisement				
		Sexe		Total
		Garçon	Fille	
p = 0,000				
IndD4R Indice d'insatisfaction de l'image corporelle - recodé	-1 Aspirant à maigrir	118 28,0%	447 64,9%	565 50,9%
	0 Satisfaits	169 40,0%	215 31,2%	384 34,6%
	1 Aspirant à engraisser	135 32,0%	27 3,9% *	162 14,6%
Total		422 100,0%	689 100,0%	1111 100,0%

Intervalle de confiance						
Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
25,3%	30,6%	62,7%	67,0%	49,1%	52,6%	0,000
37,2%	42,9%	29,1%	33,3%	32,9%	36,3%	0,000
29,2%	34,7%	3,0%	4,8%	13,3%	15,8%	0,000

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

D5a Méthodes essayées au cours des 6 derniers mois pour perdre ou contrôler le poids : Suivre une diète

Croisement				
		Sexe		Total
		Garçon	Fille	
p = 0,000				
D5a Suivre une diète	1 Souvent	8 1,9% **	20 2,8% *	28 2,5% *
	2 Quelques fois	12 2,8% **	49 7,0%	61 5,4%
	3 Rarement	12 2,8% **	79 11,2%	91 8,0%
	4 Jamais	397 92,5%	555 78,9%	952 84,1%
Total		429 100,0%	703 100,0%	1132 100,0%

Intervalle de confiance						
Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
1,1%	2,6%	2,1%	3,6%	1,9%	3,0%	0,072
1,8%	3,7%	5,9%	8,1%	4,6%	6,2%	0,000
1,8%	3,7%	9,9%	12,6%	7,1%	9,0%	0,000
91,0%	94,1%	77,2%	80,7%	82,8%	85,4%	0,000

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

D5b Méthodes essayées au cours des 6 derniers mois pour perdre ou contrôler le poids : Ne pas manger pendant toute une journée

		Croisement		Total
		Sexe		
p = 0,000		Garçon	Fille	
D5b Ne pas manger pendant toute une journée	1 Souvent	5 1,2% **	27 3,8% *	32 2,8% *
	2 Quelques fois	6 1,4% **	40 5,7% *	46 4,1%
	3 Rarement	24 5,6% *	84 12,0%	108 9,6%
	4 Jamais	393 91,8%	551 78,5%	944 83,5%
Total		428 100,0%	702 100,0%	1130 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
0,5%	1,8%	3,0%	4,7%	2,3%	3,4%	0,000
0,7%	2,1%	4,7%	6,7%	3,4%	4,8%	0,000
4,3%	6,9%	10,5%	13,4%	8,5%	10,6%	0,000
90,2%	93,4%	76,7%	80,3%	82,2%	84,8%	0,000

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

D5c Méthodes essayées au cours des 6 derniers mois pour perdre ou contrôler le poids : Prendre des laxatifs

		Croisement		Total
		Sexe		
p = 0,949		Garçon	Fille	
D5c Prendre des laxatifs	1 Souvent	3 ,7% **	5 ,7% **	8 ,7% **
	2 Quelques fois	3 ,7% **	6 ,9% **	9 ,8% **
	3 Rarement	6 1,4% **	13 1,9% **	19 1,7% *
	4 Jamais	415 97,2%	677 96,6%	1092 96,8%
Total		427 100,0%	701 100,0%	1128 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
NA	NA	0,3%	1,1%	0,4%	1,0%	NA
NA	NA	0,5%	1,3%	0,5%	1,1%	NA
0,7%	2,1%	1,3%	2,4%	1,2%	2,1%	0,330
96,2%	98,1%	95,8%	97,4%	96,2%	97,4%	0,335

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

D5d Méthodes essayées au cours des 6 derniers mois pour perdre ou contrôler le poids : Prendre des coupe-faim

		Croisement		Total
		Sexe		
p = 0,058		Garçon	Fille	
D5d Prendre des coupe-faim	1 Souvent	5 1,2% **	16 2,3% *	21 1,9% *
	2 Quelques fois	4 ,9% **	18 2,6% *	22 2,0% *
	3 Rarement	5 1,2% **	16 2,3% *	21 1,9% *
	4 Jamais	411 96,7%	652 92,9%	1063 94,3%
Total		425 100,0%	702 100,0%	1127 100,0%

						Intervalle de confiance
Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
0,5%	1,8%	1,6%	2,9%	1,4%	2,3%	0,017
NA	NA	1,9%	3,3%	1,5%	2,4%	NA
0,5%	1,8%	1,6%	2,9%	1,4%	2,3%	0,017
95,7%	97,7%	91,7%	94,0%	93,5%	95,1%	0,000

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

D5e Méthodes essayées au cours des 6 derniers mois pour perdre ou contrôler le poids : Diminuer, réduire ou couper le sucre, le gras

		Croisement		Total
		Sexe		
p = 0,000		Garçon	Fille	
D5e Diminuer, réduire ou couper le sucre, le gras	1 Souvent	36 8,4% *	151 21,5%	187 16,5%
	2 Quelques fois	92 21,5%	270 38,4%	362 32,0%
	3 Rarement	46 10,8%	98 13,9%	144 12,7%
	4 Jamais	253 59,3%	184 26,2%	437 38,7%
Total		427 100,0%	703 100,0%	1130 100,0%

						Intervalle de confiance
Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
6,8%	10,0%	19,7%	23,3%	15,2%	17,8%	0,000
19,2%	23,9%	36,3%	40,5%	30,4%	33,7%	0,000
9,0%	12,6%	12,4%	15,5%	11,6%	13,9%	0,008
56,4%	62,1%	24,3%	28,1%	37,0%	40,4%	0,000

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

D5f Méthodes essayées au cours des 6 derniers mois pour perdre ou contrôler le poids : T'entraîner de façon intensive

p = 0,084		Sexe		Total
		Garçon	Fille	
D5f T'entraîner de façon intensive	1 Souvent	59 13,9%	70 10,0%	129 11,5%
	2 Quelques fois	88 20,8%	144 20,6%	232 20,6%
	3 Rarement	88 20,8%	182 26,0%	270 24,0%
	4 Jamais	189 44,6%	304 43,4%	493 43,9%
Total		424 100,0%	700 100,0%	1124 100,0%

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
11,9%	15,9%	8,7%	11,3%	10,4%	12,6%	0,002
18,4%	23,1%	18,8%	22,4%	19,2%	22,1%	0,904
18,4%	23,1%	24,1%	27,9%	22,5%	25,5%	0,001
41,7%	47,5%	41,2%	45,6%	42,1%	45,6%	0,537

D5g Méthodes essayées au cours des 6 derniers mois pour perdre ou contrôler le poids : Commencer ou recommencer à fumer

p = 0,048		Sexe		Total
		Garçon	Fille	
D5g Commencer ou recommencer à fumer	1 Souvent	6 1,4% **	25 3,6% *	31 2,8% *
	2 Quelques fois	14 3,3% **	21 3,0% *	35 3,1% *
	3 Rarement	6 1,4% **	21 3,0% *	27 2,4% *
	4 Jamais	402 93,9%	631 90,4%	1033 91,7%
Total		428 100,0%	698 100,0%	1126 100,0%

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
0,7%	2,1%	2,8%	4,4%	2,2%	3,3%	0,000
2,2%	4,3%	2,3%	3,8%	2,5%	3,7%	0,687
0,7%	2,1%	2,3%	3,8%	1,9%	2,9%	0,002
92,5%	95,3%	89,1%	91,7%	90,8%	92,7%	0,000

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

D5h Méthodes essayées au cours des 6 derniers mois pour perdre ou contrôler le poids : Sauter des repas

		Croisement		Total
		Sexe		
p = 0,000		Garçon	Fille	
D5h Sauter des repas	1 Souvent	23 5,4% *	117 16,7%	140 12,4%
	2 Quelques fois	32 7,5% *	117 16,7%	149 13,2%
	3 Rarement	51 11,9%	117 16,7%	168 14,9%
	4 Jamais	321 75,2%	350 49,9%	671 59,5%
Total		427 100,0%	701 100,0%	1128 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
4,1%	6,7%	15,1%	18,3%	11,3%	13,6%	0,000
6,0%	9,0%	15,1%	18,3%	12,0%	14,4%	0,000
10,1%	13,8%	15,1%	18,3%	13,6%	16,1%	0,000
72,7%	77,7%	47,7%	52,1%	57,8%	61,2%	0,000

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

D5i Méthodes essayées au cours des 6 derniers mois pour perdre ou contrôler le poids : Te faire vomir après un repas

		Croisement		Total
		Sexe		
p = 0,499		Garçon	Fille	
D5i Te faire vomir après un repas	1 Souvent	3 ,7% **	5 ,7% **	8 ,7% **
	2 Quelques fois	3 ,7% **	12 1,7% **	15 1,3% **
	3 Rarement	6 1,4% **	14 2,0% **	20 1,8% *
	4 Jamais	412 97,2%	671 95,6%	1083 96,2%
Total		424 100,0%	702 100,0%	1126 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
NA	NA	0,3%	1,1%	0,4%	1,0%	NA
NA	NA	1,1%	2,3%	0,9%	1,7%	NA
0,7%	2,1%	1,4%	2,6%	1,3%	2,2%	0,219
96,2%	98,1%	94,7%	96,5%	95,5%	96,9%	0,019

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

D5j Méthodes essayées au cours des 6 derniers mois pour perdre ou contrôler le poids : Autre

Croisement

p = 0,065		Sexe		Total
		Garçon	Fille	
D5j Autre	1 Souvent	10 9,0% **	16 14,8% *	26 11,9% *
	2 Quelques fois	4 3,6% **	10 9,3% **	14 6,4% **
	3 Rarement	0 ,0% **	1 ,9% **	1 ,5% **
	4 Jamais	97 87,4%	81 75,0%	178 81,3%
Total		111 100,0%	108 100,0%	219 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
4,1%	13,9%	8,5%	21,2%	7,9%	15,9%	0,155
NA	NA	4,1%	14,4%	3,4%	9,4%	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
81,7%	93,0%	67,3%	82,7%	76,4%	86,1%	0,011

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

D5jAut Autres méthodes essayées au cours des 6 derniers mois pour perdre ou contrôler le poids

Croisement

	Sexe		Total
	Garçon	Fille	
Manger sainement/fruits et légumes	0	11	11
Entraînement régulier/normal	3	8	11
Manger plus	5	0	5
Diminuer les portions	0	4	4
Voir une nutritionniste	0	2	2
Manger régulièrement	0	1	1
Collations protéinées pour attendre les repas	1	0	1
Lipposuccion	1	0	1

I2-I3 Caractéristiques liées au sommeil des collégiens (scores moyens)

	n	Moyenne	Écart type	Erreur type	Intervalle de confiance		Coefficient de variation	p-value (Sig)	
					B. inf.	B. sup.			
I2aR Heure du coucher la semaine (1h=25h)	Garçon	413	23,02	,99	,05	22,92	23,12	4,3%	0,000
	Fille	689	22,69	,87	,03	22,62	22,75	3,8%	
	Total	1103	22,81	,93	,03	22,76	22,87	4,1%	
I2bR Heure du coucher la fin de semaine (1h=25h)	Garçon	402	24,92	1,63	,08	24,76	25,08	6,5%	0,000
	Fille	683	24,54	1,53	,06	24,43	24,66	6,2%	
	Total	1085	24,69	1,58	,05	24,59	24,78	6,4%	
I2I3aDureeSem Durée du sommeil la semaine	Garçon	413	8,01 *	1,27	,06	7,89	8,14	15,8%	0,017
	Fille	685	8,19	1,17	,04	8,10	8,28	14,3%	
	Total	1098	8,12	1,21	,04	8,05	8,20	14,9%	
I2I3bDureeFds Durée du sommeil la fin de semaine	Garçon	400	8,75 *	1,80	,09	8,58	8,93	20,5%	0,401
	Fille	679	8,84 *	1,70	,07	8,72	8,97	19,2%	
	Total	1079	8,81 *	1,73	,05	8,71	8,91	19,7%	
SommeilRat Heures de sommeil de rattrapage la fin de semaine	Garçon	400	,71 **	1,98	,10	,51	,90	280,3%	0,702
	Fille	676	,66 **	1,86	,07	,52	,80	281,5%	
	Total	1075	,68 **	1,90	,06	,56	,79	281,0%	
DiffHrsCoucher Délai de l'heure du coucher la fin de semaine	Garçon	402	1,91 **	1,42	,07	1,77	2,05	74,5%	0,523
	Fille	683	1,86 **	1,42	,05	1,75	1,96	76,5%	
	Total	1085	1,88 **	1,42	,04	1,79	1,96	75,7%	