



**ANALYSES STATISTIQUES PORTANT SUR LES HABITUDES DE VIE ET LA SANTÉ DES COLLÉGIENS
DE LA RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN**

Dans le cadre du projet : Nouvelle cohorte, nouveau régime pédagogique et partenariat renouvelé. Enjeux et défis de l'intégration et de l'engagement des étudiants du collégial.

Population à l'étude : étudiants de première année issus du renouvellement pédagogique nouvellement inscrits dans un programme dans l'un des quatre cégeps du Saguenay-Lac-Saint-Jean à l'automne 2010

Produit pour l'Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Par Michaël Gaudreault, enseignant-chercheur en statistiques

Le 15 février 2013



Méthodologie

Collecte des données

1. Enquête réalisée entre le 20 octobre et le 30 novembre 2010 dans les 10 collèges des trois régions concernées : Mauricie, Lanaudière et Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ).
2. Un questionnaire auto-administré de 148 questions a été rempli en classe durant deux périodes de cours consécutives.
3. Tous les étudiants suivant un cours de français (ou de philosophie dans certains collèges) de première année collégiale ont été ciblés pour participer à l'enquête.
4. Pour la région du SLSJ (Cégep de Chicoutimi, Cégep de Jonquière, Collège d'Alma, Cégep de Saint-Félicien), le taux de réponse est de 72 %.
5. Seuls les étudiants nouvellement inscrits au collégial dans la région du SLSJ à l'automne 2010 pour qui il s'agit de la première session au collégial et qui provenaient directement du secondaire (cohorte A J5) sont retenus dans le cadre de la présente analyse.
6. Afin d'assurer la représentativité de l'échantillon, celui-ci a été pondéré par sexe, par famille de programme¹ et par collège.
7. La grande majorité des répondants (98 %) a 17 ou 18 ans.

¹ Les neuf familles de programme considérées sont : session d'accueil et d'intégration, techniques biologiques, techniques physiques, techniques administratives, techniques des arts et des communications, techniques humaines, sciences humaines, sciences de la nature, arts.

Répartition selon le sexe pour la région du SLSJ

Sexe	Taille de la population (N)	Taille de l'échantillon (n)	Pourcentage (%)
Garçons	957	675	43,4
Filles	1 240	879	56,6
Sexes réunis	2 197	1 554	100,0

Présentation des résultats

8. Pour chaque tableau, le nom de la variable indiqué dans le titre réfère au numéro de la question dans le questionnaire. Lorsque qu'une variable porte un nom débutant par Ind ou Ech, c'est que la variable présentée provient de plusieurs sous-questions qui ont été regroupées pour produire une échelle ou un indice. (ex. IndH1 correspond à l'indice d'insécurité alimentaire qui est construit à l'aide des trois premières sous-questions de la question H1).
9. Il est normal que le nombre de répondants diffère légèrement d'une question à l'autre en raison de la non-réponse. De plus, certaines questions ont été posées uniquement à une partie des étudiants. Par exemple, les questions concernant la contraception ne s'adressaient qu'aux étudiants ayant déjà eu une relation sexuelle complète.
10. Pour certaines variables, la variable originale est présentée ainsi qu'une variable dite *recodée* pour laquelle certaines modalités ont été regroupées (le nom des variables recodée se termine par R ou Rec).

11. L'indice Dep-Ado n'a pu être reconstitué étant donné que certaines des questions qui le composent dans les enquêtes auprès des élèves fréquentant le secondaire âgés de 12 à 17 ans n'ont pas la même portée pour les collégiens de 17-18 ans (fréquence de consommation d'alcool, consommation régulière d'alcool, nombre d'enivrements).

Tests statistiques

12. La valeur p (significativité observée) présentée en haut à gauche de chaque tableau croisé est obtenue à l'aide d'un test du Chi-carré. Elle permet de déterminer si les caractéristiques des garçons et des filles diffèrent pour cette variable. Une valeur inférieure à 0,05 (présentée avec une trame grise) indique que les garçons et les filles se distinguent au seuil de 5 %. Les trames verte et rouge indiquent quant à elle des différences significatives aux seuils respectifs de 1 % et 0,1 %.

13. Dans les cas où les conditions d'application du Chi-carré ne sont pas respectées (plus de 20 % de cases avec des fréquences espérées inférieures à 5), des tests exacts de Fisher ont été réalisés.

14. Des tests de différences de proportions pour chaque modalité de la variable sont présentés dans la dernière colonne du tableau de droite sous forme de significativité observée (p-value). Ils permettent d'identifier les modalités pour qui les prévalences des garçons et des filles se distinguent au seuil de 5% (trame grise), au seuil de 1% (trame verte) et au seuil de 0,1% (trame rouge).

15. Étant donné que la population à l'étude est finie et que le taux d'échantillonnage est supérieur à 5 %, nous avons utilisé une correction pour les populations finies lors des calculs des tests de différence de proportion ($\sqrt{1 - n/N}$). L'impact de cette correction est de réduire la marge d'erreur et par le fait même, de rendre le test plus discriminant.

16. Pour les variables de sommeil pouvant être mesurées à l'aide de scores moyens, la valeur moyenne, l'écart type et l'erreur type sont calculés. Des tests *t* ont également été réalisés (dernière colonne du tableau) afin de déterminer si les garçons et les filles se distinguent quant à leurs caractéristiques de sommeil en utilisant le même code de couleur que pour les tableaux croisés (gris, vert, rouge).

17. Un croisement a été effectué entre les variables *Fréquence d'utilisation du condom* (J5a) et *Fréquence d'utilisation d'une méthode hormonale* (J5b) comme méthodes contraceptives. Chaque prévalence est calculée en se basant sur le nombre total de répondants pour chaque sexe. Des tests de différence de proportion sont effectués pour chaque prévalence afin de déterminer si les garçons et les filles se distinguent. Les résultats de ces tests sont présentés sous forme valeur p (p-value) dans le tableau disposé sous le tableau croisé. Les différences significatives au seuil de 5 % sont identifiées au moyen du même code de couleur que pour les tests de différences de proportion décrits précédemment.

18. Un second tableau permet aussi de comparer l'utilisation du condom et l'utilisation d'une méthode hormonale, pour les garçons, pour les filles et sexes réunis, mais en divisant cette fois chaque effectif par le total de la ligne correspondante.

Intervalles de confiance et coefficients de variation

19. Des intervalles de confiance avec un niveau de confiance de 95 % sont calculés pour chaque prévalence et pour chaque score moyen. Les bornes inférieures (B. inf.) et supérieures (B. sup.) sont présentées à droite de chaque tableau.
20. Étant donné que la population à l'étude est finie et que le taux d'échantillonnage est supérieur à 5 %, nous avons utilisé une correction pour les populations finies lors des calculs d'intervalles de confiance ($\sqrt{1 - n/N}$). L'impact de cette correction est de réduire la marge d'erreur et par le fait même, la largeur de l'intervalle de confiance.
21. N.B. Les intervalles de confiance et les tests de différence de proportion sont remplacés par la valeur NA (pour non applicable) lorsque leurs conditions respectives d'utilisation ne sont pas respectées ($n < 30$ ou $np < 5$ ou $n(1-p) < 5$).
22. Pour les variables présentant les réponses *Autres* (H5gAut, J5cAut, D5jAut), les prévalences et les intervalles de confiance n'ont pas été calculés vu le faible nombre de répondants à ces questions.
23. Un coefficient de variation (CV) est calculé pour chaque prévalence et chaque score moyen. Un CV compris entre 15 % et 25 % indique une estimation devant être interprétée avec prudence et sera identifié dans le tableau de gauche à l'aide d'un astérisque. Un CV supérieur à 25 % indique une estimation imprécise et sera identifié à l'aide de deux astérisques.

24. Des coefficients de variation (CV) sont calculés pour chaque proportion estimée en divisant l'erreur type de l'estimation par l'estimation elle-même.

$$\text{Formule utilisée : CV} = \frac{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}{p} \times 100$$

25. Pour les variables de sommeil présentés sous forme de scores moyens, des coefficients de variation (CV) sont calculés en divisant l'écart type par la moyenne. Il est à noter que les valeurs élevées observées pour les CV des variables *Délai de l'heure du coucher la fin de semaine* et *Nombre d'heures de sommeil de rattrapage la fin de semaine* sont attribuables au fait que ces deux mesures peuvent prendre des valeurs négatives et que par conséquent, les moyennes calculées sont petites en comparaison avec l'écart type.

$$\text{Formule utilisée : CV} = \frac{s}{\bar{x}} \times 100$$

Liste des variables

Sections du questionnaire	Questions	Déterminants
H : Ton alimentation	H1	Insécurité alimentaire
	H2	Nombre de repas chaque jour
	H3	Fréquence à laquelle l'étudiant déjeune avant les cours
	H4	Fréquence de consommation de boissons énergisantes
	H5	Raisons de consommer des boissons énergisantes
I : Ta santé	I1	Perception de l'état de santé générale
J : Amour et sexualité	J1	Présence d'une relation amoureuse
	J2	Relation sexuelle complète
	J3	Nombre de partenaires sexuelles
	J4	Utilisation du condom
	J5	Méthode contraceptive utilisée
	J5a-J5b	Croisement entre l'utilisation du condom et d'une méthode hormonale comme méthode contraceptive
	J6	Utilisation de la contraception orale d'urgence
K : Ta consommation de tabac, d'alcool et de drogues	K1	Fumeur régulier ou non
	K2	Fumeur de cigares ou cigarillo
	K3	Fréquence de consommation d'alcool
	K4	Fréquence des enivrements
	K6	Consommation régulière d'alcool
	K8	Fréquence de consommation de drogues
	K10	Consommation régulière de drogues
	K13	Conséquences de la consommation d'alcool ou de drogues
D : Comment tu te perçois?	D2-D3	Indice de masse corporelle
	D4	Silhouette réelle et souhaitée
	D4	Indice d'insatisfaction de l'image corporelle
	D5	Méthodes pour perdre du poids ou contrôler son poids
I : Sommeil (scores moyens)	I2	Heure de coucher (semaine et fin de semaine)
	I2-I3	Durée du sommeil (semaine et fin de semaine)
	I2-I2	Heures de sommeil de rattrapage la fin de semaine
	I2-I3	Délai de l'heure du coucher la fin de semaine

IndH1 Indice d'insécurité alimentaire (situation souvent ou parfois vraie à l'un des 3 premiers énoncés)

		Croisement		Total
		Sexe		
		Garçons	Filles	
p = 0,326				
IndH1 Indice d'insécurité alimentaire (situation souvent ou parfois vraie à l'un des 3 premiers énoncés)	1 Oui	135 21,6%	165 19,4%	300 20,4%
	2 Non	490 78,4%	684 80,6%	1174 79,6%
Total		625 100,0%	849 100,0%	1474 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
19,7%	23,5%	17,9%	20,9%	19,2%	21,5%	0,079
76,5%	80,3%	79,1%	82,1%	78,5%	80,8%	0,079

H1a Je mange la même chose plusieurs jours de suite parce que chez moi nous n'avons que quelques aliments sous la main et n'avons pas d'argent pour en acheter d'autres.

		Croisement		Total
		Sexe		
		Garçons	Filles	
p = 0,139				
H1a Je mange la même chose plusieurs jours de suite parce que chez moi nous n'avons que quelques aliments sous la main et n'avons pas d'argent pour en acheter d'autres.	1 Situation souvent vraie	18 2,8% *	12 1,4% **	30 2,0% *
	2 Situation parfois vraie	83 13,1%	119 13,9%	202 13,6%
	3 Situation jamais vraie	532 84,0%	725 84,7%	1257 84,4%
Total		633 100,0%	856 100,0%	1489 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
2,1%	3,6%	1,0%	1,8%	1,6%	2,4%	0,001
11,6%	14,6%	12,6%	15,2%	12,6%	14,6%	0,439
82,4%	85,7%	83,4%	86,0%	83,4%	85,5%	0,549

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

H1b Je mange moins que je devrais, parce que chez moi nous n'avons pas assez d'argent pour la nourriture.

p = 0,124		Croisement		Total
		Sexe		
		Garçons	Filles	
H1b Je mange moins que je devrais, parce que chez moi nous n'avons pas assez d'argent pour la nourriture.	1 Situation souvent vraie	9 1,4% **	4 ,5% **	13 ,9% **
	2 Situation parfois vraie	24 3,8% *	28 3,3% *	52 3,5%
	3 Situation jamais vraie	597 94,8%	820 96,2%	1417 95,6%
Total		630 100,0%	852 100,0%	1482 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
0,9%	2,0%	NA	NA	0,6%	1,1%	0,002
2,9%	4,7%	2,6%	4,0%	3,0%	4,0%	0,352
93,7%	95,8%	95,5%	97,0%	95,0%	96,2%	0,019

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

H1c Je ne peux pas m'offrir des repas équilibrés parce que chez moi nous ne pouvons pas nous le permettre financièrement.

p = 0,821		Croisement		Total
		Sexe		
		Garçons	Filles	
H1c Je ne peux pas m'offrir des repas équilibrés parce que chez moi nous ne pouvons pas nous le permettre financièrement.	1 Situation souvent vraie	28 4,4% *	35 4,1% *	63 4,3%
	2 Situation parfois vraie	33 5,2% *	49 5,8%	82 5,5%
	3 Situation jamais vraie	572 90,4%	764 90,1%	1336 90,2%
Total		633 100,0%	848 100,0%	1481 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
3,5%	5,4%	3,4%	4,9%	3,7%	4,8%	0,628
4,2%	6,2%	4,9%	6,7%	4,9%	6,2%	0,408
89,0%	91,7%	89,0%	91,2%	89,3%	91,1%	0,763

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

H1d Je ne m'alimente pas aussi bien que je le devrais parce que je ne sais pas cuisiner.

Croisement				
p = 0,035		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
H1d Je ne m'alimente pas aussi bien que je le devrais parce que je ne sais pas cuisiner.	1 Situation souvent vraie	33 5,2% *	33 3,9% *	66 4,4%
	2 Situation parfois vraie	210 33,2%	241 28,3%	451 30,4%
	3 Situation jamais vraie	389 61,6%	579 67,9%	968 65,2%
Total		632 100,0%	853 100,0%	1485 100,0%

Intervalle de confiance							p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total			
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.		
4,2%	6,2%	3,1%	4,6%	3,8%	5,0%	0,033	
31,1%	35,4%	26,6%	29,9%	29,0%	31,7%	0,000	
59,3%	63,8%	66,1%	69,6%	63,8%	66,6%	0,000	

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

H1e Je ne m'alimente pas aussi bien que je le devrais parce que je manque de temps.

Croisement				
p = 0,048		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
H1e Je ne m'alimente pas aussi bien que je le devrais parce que je manque de temps.	1 Situation souvent vraie	50 7,9%	81 9,5%	131 8,8%
	2 Situation parfois vraie	222 35,2%	342 40,0%	564 38,0%
	3 Situation jamais vraie	359 56,9%	431 50,5%	790 53,2%
Total		631 100,0%	854 100,0%	1485 100,0%

Intervalle de confiance							p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total			
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.		
6,7%	9,2%	8,4%	10,6%	8,0%	9,6%	0,063	
33,0%	37,4%	38,2%	41,9%	36,6%	39,4%	0,001	
54,6%	59,1%	48,6%	52,3%	51,8%	54,6%	0,000	

H2 Généralement, combien de repas prends-tu chaque jour?

		Croisement		
		Sexe		Total
p = 0,000		Garçons	Filles	
H2 Généralement, combien de repas prends-tu chaque jour?	1	2 ,3% **	7 ,8% **	9 ,6% **
	2	82 13,2%	142 16,6%	224 15,2%
	3	477 77,1%	686 80,1%	1163 78,8%
	4	46 7,4%	17 2,0% *	63 4,3%
	5	7 1,1% **	3 ,4% **	10 ,7% **
	6	3 ,5% **	1 ,1% **	4 ,3% **
	7	2 ,3% **	0 ,0% **	2 ,1% **
Total		619 100,0%	856 100,0%	1475 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
NA	NA	0,5%	1,2%	0,4%	0,8%	NA
11,7%	14,8%	15,2%	18,0%	14,1%	16,2%	0,002
75,1%	79,0%	78,7%	81,6%	77,7%	80,0%	0,014
6,2%	8,7%	1,5%	2,5%	3,7%	4,9%	0,000
0,6%	1,6%	NA	NA	0,4%	0,9%	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

H2R Généralement, combien de repas prends-tu chaque jour - recodée

		Croisement		
		Sexe		Total
p = 0,000		Garçons	Filles	
H2R Généralement, combien de repas prends-tu chaque jour - recodée	1 Moins de 3 repas par jour	84 13,5%	149 17,4%	233 15,8%
	2 3 repas par jour	477 76,9%	686 80,1%	1163 78,8%
	3 Plus de 3 repas par jour	59 9,5%	21 2,5% *	80 5,4%
Total		620 100,0%	856 100,0%	1476 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
11,9%	15,1%	16,0%	18,8%	14,7%	16,9%	0,000
75,0%	78,9%	78,7%	81,6%	77,6%	80,0%	0,011
8,1%	10,9%	1,9%	3,0%	4,8%	6,1%	0,000

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

H3 Pense aux 5 derniers jours passés au cégep. Combien de jours as-tu mangé ou bu quelque chose le matin avant les cours?

Croisement

p = 0,031		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
H3 Pense aux 5 derniers jours passés au cégep. Combien de jours as-tu mangé ou bu quelque chose le matin avant les cours?	1 5 jours (tous les jours)	425 65,3%	548 62,9%	973 63,9%
	2 3 ou 4 jours	95 14,6%	154 17,7%	249 16,4%
	3 1 ou 2 jour(s)	69 10,6%	113 13,0%	182 12,0%
	4 Aucun jour	62 9,5%	56 6,4%	118 7,8%
Total		651 100,0%	871 100,0%	1522 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
63,2%	67,4%	61,2%	64,7%	62,6%	65,3%	0,087
13,1%	16,1%	16,3%	19,1%	15,3%	17,4%	0,003
9,3%	11,9%	11,8%	14,2%	11,1%	12,9%	0,010
8,2%	10,8%	5,5%	7,3%	7,0%	8,5%	0,000

H4 Au cours des six derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé des boissons énergisantes?

		Croisement		
		Sexe		Total
p = 0,000		Garçons	Filles	
H4 Au cours des six derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé des boissons énergisantes?	1 Tous les jours ou presque	2 ,3%	4 ,5% **	6 ,4% **
	2 Trois à cinq fois par semaine	22 3,4% *	17 2,0% *	39 2,6% *
	3 Une ou deux fois par semaine	60 9,3%	64 7,4%	124 8,2%
	4 Une ou deux fois par mois	121 18,7%	90 10,4%	211 13,9%
	5 Moins d'une fois par mois	105 16,2%	115 13,2%	220 14,5%
	6 J'en ai déjà bu mais je n'en ai pas pris au cours des 6 derniers mois	123 19,0%	198 22,8%	321 21,2%
	7 Je n'en ai jamais bu	215 33,2%	380 43,8%	595 39,2%
Total		648 100,0%	868 100,0%	1516 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
NA	NA	NA	NA	0,2%	0,6%	NA
2,6%	4,2%	1,5%	2,5%	2,1%	3,0%	0,003
8,0%	10,5%	6,4%	8,3%	7,4%	8,9%	0,020
17,0%	20,4%	9,3%	11,5%	12,9%	14,9%	0,000
14,6%	17,8%	12,0%	14,5%	13,5%	15,5%	0,004
17,3%	20,7%	21,3%	24,3%	20,0%	22,3%	0,001
31,1%	35,2%	42,0%	45,6%	37,9%	40,6%	0,000

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

H5a Je consomme des boissons énergisantes pour rester éveillé.

p = 0,046		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
H5a Je consomme des boissons énergisantes pour rester éveillé.	1 Pas du tout d'accord	76 24,9%	50 17,4%	126 21,3%
	2 Partiellement d'accord	49 16,1%	62 21,6%	111 18,8%
	3 Plutôt d'accord	92 30,2%	101 35,2%	193 32,6%
	4 Tout à fait d'accord	88 28,9%	74 25,8%	162 27,4%
Total		305 100,0%	287 100,0%	592 100,0%

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
20,9%	28,9%	13,6%	21,3%	18,5%	24,1%	0,008
12,7%	19,5%	17,4%	25,8%	16,1%	21,4%	0,044
25,9%	34,4%	30,3%	40,0%	29,4%	35,8%	0,126
24,7%	33,0%	21,3%	30,2%	24,3%	30,4%	0,325

H5b Je consomme des boissons énergisantes pour me donner de l'énergie lors d'activités sportives.

p = 0,016		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
H5b Je consomme des boissons énergisantes pour me donner de l'énergie lors d'activités sportives.	1 Pas du tout d'accord	164 54,1%	171 60,0%	335 57,0%
	2 Partiellement d'accord	46 15,2%	58 20,4%	104 17,7%
	3 Plutôt d'accord	65 21,5%	40 14,0%	105 17,9%
	4 Tout à fait d'accord	28 9,2% *	16 5,6% *	44 7,5%
Total		303 100,0%	285 100,0%	588 100,0%

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
49,5%	58,8%	55,0%	65,0%	53,5%	60,4%	0,091
11,8%	18,5%	16,2%	24,5%	15,0%	20,3%	0,055
17,6%	25,3%	10,5%	17,6%	15,2%	20,5%	0,005
6,5%	11,9%	3,3%	8,0%	5,7%	9,3%	0,047

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

H5c Je consomme des boissons énergisantes pour m'hydrater et satisfaire ma soif.

p = 0,264		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
H5c Je consomme des boissons énergisantes pour m'hydrater et satisfaire ma soif.	1 Pas du tout d'accord	173 57,1%	174 60,8%	347 58,9%
	2 Partiellement d'accord	61 20,1%	55 19,2%	116 19,7%
	3 Plutôt d'accord	49 16,2%	48 16,8%	97 16,5%
	4 Tout à fait d'accord	20 6,6% *	9 3,1% **	29 4,9% *
Total		303 100,0%	286 100,0%	589 100,0%

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
52,5%	61,7%	55,9%	65,8%	55,5%	62,3%	0,279
16,4%	23,9%	15,2%	23,2%	16,9%	22,4%	0,747
12,7%	19,6%	13,0%	20,6%	13,9%	19,0%	0,815
4,3%	8,9%	1,4%	4,9%	3,4%	6,4%	0,020

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

H5d Je consomme des boissons énergisantes pour faire comme les autres.

p = 0,759		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
H5d Je consomme des boissons énergisantes pour faire comme les autres.	1 Pas du tout d'accord	273 91,0%	255 88,9%	528 89,9%
	2 Partiellement d'accord	14 4,7% **	18 6,3% *	32 5,5% *
	3 Plutôt d'accord	6 2,0% **	8 2,8% **	14 2,4% **
	4 Tout à fait d'accord	7 2,3% **	6 2,1% **	13 2,2% **
Total		300 100,0%	287 100,0%	587 100,0%

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
88,3%	93,7%	85,7%	92,0%	87,9%	92,0%	0,312
2,7%	6,6%	3,8%	8,7%	3,9%	7,0%	0,319
0,7%	3,3%	1,1%	4,5%	1,3%	3,4%	0,467
0,9%	3,7%	0,6%	3,5%	1,2%	3,2%	0,814

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

H5e Je consomme des boissons énergisantes parce que le goût est bon.

p = 0,077		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
H5e Je consomme des boissons énergisantes parce que le goût est bon.	1 Pas du tout d'accord	66 21,4%	77 26,9%	143 24,1%
	2 Partiellement d'accord	44 14,3%	54 18,9%	98 16,5%
	3 Plutôt d'accord	102 33,1%	86 30,1%	188 31,6%
	4 Tout à fait d'accord	96 31,2%	69 24,1%	165 27,8%
Total		308 100,0%	286 100,0%	594 100,0%

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
17,7%	25,2%	22,4%	31,4%	21,1%	27,0%	0,067
11,1%	17,5%	14,9%	22,9%	13,9%	19,0%	0,078
28,8%	37,4%	25,4%	34,7%	28,5%	34,8%	0,348
26,9%	35,4%	19,8%	28,5%	24,7%	30,9%	0,023

H5f Je consomme des boissons énergisantes pour remplacer une boisson gazeuse.

p = 0,017		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
H5f Je consomme des boissons énergisantes pour remplacer une boisson gazeuse.	1 Pas du tout d'accord	168 55,6%	191 67,0%	359 61,2%
	2 Partiellement d'accord	62 20,5%	36 12,6% *	98 16,7%
	3 Plutôt d'accord	47 15,6%	42 14,7%	89 15,2%
	4 Tout à fait d'accord	25 8,3% *	16 5,6% *	41 7,0% *
Total		302 100,0%	285 100,0%	587 100,0%

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
51,0%	60,3%	62,2%	71,8%	57,8%	64,5%	0,001
16,8%	24,3%	9,2%	16,0%	14,1%	19,3%	0,002
12,2%	18,9%	11,1%	18,3%	12,7%	17,6%	0,744
5,7%	10,8%	3,3%	8,0%	5,2%	8,7%	0,134

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

H5g Je consomme des boissons énergisantes pour d'autres raisons

Croisement

p = 0,775		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
H5g Je consomme des boissons énergisantes pour d'autres raisons	1 Pas du tout d'accord	31 63,3%	21 53,8%	52 59,1%
	2 Partiellement d'accord	1 2,0% **	1 2,6% **	2 2,3% **
	3 Plutôt d'accord	5 10,2% **	3 7,7% **	8 9,1% **
	4 Tout à fait d'accord	12 24,5% **	14 35,9% *	26 29,5% *
Total		49 100,0%	39 100,0%	88 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
50,1%	76,4%	38,4%	69,2%	49,0%	69,2%	0,362
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1,9%	18,5%	NA	NA	3,2%	15,0%	NA
12,8%	36,2%	21,1%	50,7%	20,2%	38,9%	0,237

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

H5gAut Autres raisons de consommer des boissons énergisantes

Croisement

	Sexe		Total
	Garçons	Filles	
Pour remplacer l'alcool	1	5	6
Pour avoir plus d'énergie	2	2	4
Pour augmenter la concentration	0	2	2
Pour étudier/travailler de soir ou de nuit	1	1	2
J'aime l'effet	0	1	1
Pour maigrir	1	0	1
Pour augmenter l'effet de l'alcool	1	0	1
Pour y goûter	1	0	1

I1 Comparativement à d'autres personnes de ton âge, dirais-tu que ta santé est en général...?

		Croisement		
		Sexe		Total
p = 0,000		Garçons	Filles	
I1 Comparativement à d'autres personnes de ton âge, dirais-tu que ta santé est en général...?	1 Excellente	204 31,6%	159 18,3%	363 24,0%
	2 Très bonne	272 42,1%	378 43,5%	650 42,9%
	3 Bonne	126 19,5%	258 29,7%	384 25,3%
	4 Moyenne	37 5,7% *	69 7,9%	106 7,0%
	5 Mauvaise	7 1,1% **	5 ,6% **	12 ,8% **
Total		646 100,0%	869 100,0%	1515 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
29,5%	33,6%	16,9%	19,7%	22,8%	25,2%	0,000
39,9%	44,3%	41,7%	45,3%	41,5%	44,3%	0,333
17,8%	21,2%	28,0%	31,4%	24,1%	26,6%	0,000
4,7%	6,7%	7,0%	8,9%	6,3%	7,7%	0,002
0,6%	1,5%	0,3%	0,9%	0,5%	1,0%	0,061

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

J1 As-tu actuellement un chum ou une blonde?

		Croisement		
		Sexe		Total
p = 0,000		Garçons	Filles	
J1 As-tu actuellement un chum ou une blonde?	1 Oui	239 36,7%	442 50,6%	681 44,7%
	2 Non	413 63,3%	431 49,4%	844 55,3%
Total		652 100,0%	873 100,0%	1525 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
34,6%	38,7%	48,8%	52,4%	43,3%	46,0%	0,000
61,3%	65,4%	47,6%	51,2%	54,0%	56,7%	0,000

J2 As-tu déjà eu une relation sexuelle complète avec pénétration (anale ou vaginale)?

		Croisement		Total
		Sexe		
p = 0,001		Garçons	Filles	
J2 As-tu déjà eu une relation sexuelle complète avec pénétration (anale ou vaginale)?	1 Oui	373 57,1%	573 65,7%	946 62,0%
	2 Non	280 42,9%	299 34,3%	579 38,0%
Total		653 100,0%	872 100,0%	1525 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
55,0%	59,3%	64,0%	67,4%	60,7%	63,4%	0,000
40,7%	45,0%	32,6%	36,0%	36,6%	39,3%	0,000

J3R Nombre de partenaires différents - recodée

		Croisement		Total
		Sexe		
p = 0,001		Garçons	Filles	
J3R Nombre de partenaires différents - recodée	0 Aucun	280 43,1%	299 34,4%	579 38,1%
	1 Un partenaire	186 28,6%	255 29,3%	441 29,0%
	2 Plus d'un partenaire	184 28,3%	316 36,3%	500 32,9%
Total		650 100,0%	870 100,0%	1520 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
40,9%	45,2%	32,6%	36,1%	36,7%	39,4%	0,000
26,6%	30,6%	27,7%	31,0%	27,7%	30,3%	0,596
26,3%	30,3%	34,6%	38,1%	31,6%	34,2%	0,000

J3Rec Nombre de partenaires différents - (si aucune relation sexuelle, nbr de partenaires =0)

Croisement

	Sexe		Total
	Garçons	Filles	
J3Rec Nombre de partenaires différents - 0 (si aucune relation sexuelle, nbr de partenaires =0)	280 43,0%	299 34,3%	579 38,0%
1	186 28,6%	255 29,2%	441 29,0%
2	82 12,6%	123 14,1%	205 13,5%
3	33 5,1%	66 7,6%	99 6,5%
4	23 3,5%	37 4,2%	60 3,9%
5	15 2,3%	31 3,6%	46 3,0%
6	11 1,7%	23 2,6%	34 2,2%
7	6 ,9%	12 1,4%	18 1,2%
8	5 ,8%	9 1,0%	14 ,9%
9	1 ,2%	4 ,5%	5 ,3%
10	3 ,5%	7 ,8%	10 ,7%

11	0 ,0%	1 ,1%	1 ,1%
12	2 ,3%	1 ,1%	3 ,2%
13	0 ,0%	1 ,1%	1 ,1%
15	2 ,3%	2 ,2%	4 ,3%
21	2 ,3%	0 ,0%	2 ,1%
24	0 ,0%	1 ,1%	1 ,1%
Total	651 100,0%	872 100,0%	1523 100,0%

J4 Lors de tes relations sexuelles, utilises-tu le condom pour te protéger des infections transmissibles sexuellement?

		Croisement		Total
		Sexe		
p = 0,011		Garçons	Filles	
J4 Lors de tes relations sexuelles, utilises-tu le condom pour te protéger des infections transmissibles sexuellement?	1 Toujours	180 48,6%	230 40,1%	410 43,5%
	2 Occasionnellement	134 36,2%	219 38,2%	353 37,4%
	3 Jamais	56 15,1%	124 21,6%	180 19,1%
Total		370 100,0%	573 100,0%	943 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
44,7%	52,6%	37,2%	43,1%	41,1%	45,9%	0,001
32,4%	40,1%	35,3%	41,1%	35,1%	39,8%	0,415
12,3%	18,0%	19,2%	24,1%	17,2%	21,0%	0,001

J5a Lors de tes relations sexuelles, utilises-tu : Le condom?

Croisement			
p = 0,001	Sexe		Total
	Garçons	Filles	
J5a Lors de tes relations sexuelles, utilises-tu : Le condom?	180	209	389
1 Toujours	49,7%	38,6%	43,1%
2 Occasionnellement	140	229	369
	38,7%	42,3%	40,9%
3 Jamais	42	103	145
	11,6%	19,0%	16,1%
Total	362	541	903
	100,0%	100,0%	100,0%

Intervalle de confiance						
Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
45,7%	53,8%	35,6%	41,7%	40,6%	45,6%	0,000
34,7%	42,6%	39,2%	45,5%	38,4%	43,3%	0,155
9,0%	14,2%	16,6%	21,5%	14,2%	17,9%	0,000

J5b Lors de tes relations sexuelles, utilises-tu : Une méthode hormonale (pilule, timbre, anneau, injection contraceptive)?

Croisement			
p = 0,000	Sexe		Total
	Garçons	Filles	
J5b Lors de tes relations sexuelles, utilises-tu : Une méthode hormonale (pilule, timbre, anneau, injection contraceptive)?	239	509	748
1 Toujours	68,7%	89,6%	81,7%
2 Occasionnellement	35	24	59
	10,1% *	4,2% *	6,4%
3 Jamais	74	35	109
	21,3%	6,2% *	11,9%
Total	348	568	916
	100,0%	100,0%	100,0%

Intervalle de confiance						
Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
64,8%	72,6%	87,8%	91,5%	79,7%	83,6%	0,000
7,5%	12,6%	3,0%	5,4%	5,2%	7,7%	0,000
17,8%	24,7%	4,7%	7,6%	10,3%	13,5%	0,000

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

J5a et J5b (version 1) : Croisement entre l'utilisation du condom et l'utilisation d'une méthode hormonale (pilule, timbre, anneau, injection contraceptive), lors des relations sexuelles (exprimé en % du total)

Croisement

	Sexe		Utilisation d'une méthode hormonale			Total ¹
			Toujours	Occasion.	Jamais	
Utilisation du condom	Garçons	Toujours	94 27,6%	26 7,6% *	47 13,8%	167 49,1%
		Occasion.	100 29,4%	9 2,6% **	24 7,1% *	133 39,1%
		Jamais	37 10,9% *	0 ,0% **	3 ,9% **	40 11,8%
		Total ¹	231 67,9%	35 10,3% *	74 21,8%	340 100,0%
	Filles	Toujours	177 32,8%	6 1,1% **	24 4,5% *	207 38,4%
		Occasion.	203 37,7%	15 2,8% **	11 2,0% **	229 42,5%
		Jamais	101 18,7%	1 ,2% **	1 ,2% **	103 19,1%
		Total ¹	481 89,2%	22 4,1% *	36 6,7% *	539 100,0%
	Sexes réunis	Toujours	271 30,9%	31 3,5% *	71 8,1%	373 42,5%
		Occasion.	303 34,5%	24 2,7% *	34 3,9% *	361 41,1%
		Jamais	139 15,8%	1 ,1% **	4 ,5% **	144 16,4%
		Total ¹	713 81,2%	56 6,4%	109 12,4%	878 100,0%

Intervalle de confiance

Toujours		Occasion.		Jamais		Total	
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.
24,3%	31,0%	5,6%	9,6%	11,2%	16,4%	45,4%	52,9%
26,0%	32,8%	1,4%	3,9%	5,1%	9,0%	35,4%	42,8%
8,5%	13,2%	NA	NA	NA	NA	9,3%	14,2%
64,4%	71,5%	8,0%	12,6%	18,7%	24,9%	NA	NA
30,0%	35,6%	0,5%	1,7%	3,2%	5,7%	35,5%	41,3%
34,8%	40,6%	1,8%	3,8%	1,2%	2,9%	39,5%	45,4%
16,4%	21,1%	NA	NA	NA	NA	16,8%	21,5%
87,4%	91,1%	2,9%	5,3%	5,2%	8,2%	NA	NA
28,7%	33,0%	2,7%	4,4%	6,8%	9,4%	40,2%	44,8%
32,3%	36,7%	2,0%	3,5%	3,0%	4,8%	38,8%	43,4%
14,1%	17,5%	NA	NA	NA	NA	14,7%	18,1%
79,4%	83,0%	5,2%	7,5%	10,9%	14,0%	NA	NA

¹ Les écarts mineurs observés entre les prévalences mesurées sur les lignes ou colonnes Total et celles mesurées dans les tableaux J5a et J5b sont attribuables à la non réponse.

Test de différence de proportion (p-value) pour vérifier la présence de différences significatives entre les garçons et les filles.

Utilisation du condom	Utilisation d'une méthode hormonale			
	Toujours	Occasion.	Jamais	Total
Toujours	0,100	0,000	0,000	0,002
Occasion.	0,011	0,904	0,001	0,321
Jamais	0,001	0,317	0,197	0,003
Total	0,000	0,001	0,000	

J5a et J5b (version 2) : Croisement entre l'utilisation du condom et l'utilisation d'une méthode hormonale (pilule, timbre, anneau, injection contraceptive), lors des relations sexuelles (exprimé en % de chaque ligne)

Croisement						Intervalle de confiance						
	Sexe		Utilisation d'une méthode hormonale			Total	Toujours		Occasion.		Jamais	
			Toujours	Occasion.	Jamais		B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.
Utilisation du condom	Garçons	Toujours	94	26	47	167						
			56,3%	15,6% *	28,1%	100,0%	48,8%	63,8%	10,1%	21,1%	21,3%	35,0%
		Occasion.	100	9	24	133						
			75,2%	6,8% **	18,0% *	100,0%	67,8%	82,5%	2,5%	11,0%	11,5%	24,6%
	Jamais	37	0	3	40							
		92,5%	,0% **	7,5% **	100,0%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Total ¹	231	35	74	340							
		67,9%	10,3% *	21,8%	100,0%	64,4%	71,5%	8,0%	12,6%	18,7%	24,9%	
	Filles	Toujours	177	6	24	207						
			85,5%	2,9% **	11,6% *	100,0%	80,7%	90,3%	0,6%	5,2%	7,2%	16,0%
		Occasion.	203	15	11	229						
			88,6%	6,6% *	4,8% **	100,0%	84,5%	92,8%	3,3%	9,8%	2,0%	7,6%
Jamais	101	1	1	103								
	98,1%	1,0% **	1,0% **	100,0%	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
Total ¹	481	22	36	539								
	89,2%	4,1% *	6,7% *	100,0%	87,4%	91,1%	2,9%	5,3%	5,2%	8,2%		
Sexes réunis	Toujours	271	31	71	373							
		72,7%	8,3% *	19,0%	100,0%	68,1%	77,2%	5,5%	11,1%	15,1%	23,0%	
	Occasion.	303	24	34	361							
		83,9%	6,6% *	9,4% *	100,0%	80,1%	87,7%	4,1%	9,2%	6,4%	12,4%	
Jamais	139	1	4	144								
	96,5%	,7% **	2,8% **	100,0%	93,5%	99,5%	NA	NA	NA	NA		
Total ¹	713	56	109	878								
	81,2%	6,4%	12,4%	100,0%	79,4%	83,0%	5,2%	7,5%	10,9%	14,0%		

¹ Les écarts mineurs observés entre les prévalences mesurées sur les lignes Total et celles mesurées dans le tableau J5b sont attribuables à la non réponse.

Test de différence de proportion (p-value) pour vérifier la présence de différences significatives entre les garçons et les filles.

Utilisation du condom	Utilisation d'une méthode hormonale		
	Toujours	Occasion.	Jamais
Toujours	0,000	0,000	0,000
Occasion.	0,002	0,937	0,000
Jamais	NA	NA	NA
Total	0,000	0,001	0,000

J5c Lors de tes relations sexuelles, utilises-tu : Autre méthode?

Croisement			
p = 0,234	Sexe		Total
	Garçons	Filles	
J5c Lors de tes relations sexuelles, utilises-tu : Autre méthode?	1	2	3
1 Toujours	2,1% **	5,1% **	3,5% **
2 Occasionnellement	0	2	2
	,0% **	5,1% **	2,3% **
3 Jamais	46	35	81
	97,9%	89,7%	94,2%
Total	47	39	86
	100,0%	100,0%	100,0%

Intervalle de confiance						
Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	89,3%	99,0%	NA

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

J5cAut Autres méthodes contraceptives utilisées

Croisement			
	Sexe		Total
	Garçons	Filles	
Aucune méthode (car couple stable)	0	1	1
Aucune méthode (car homosexuel)	1	2	3
Coit interrompu	0	1	1

J6 Au cours des 12 derniers mois, combien de fois as-tu utilisé la contraception orale d'urgence (pilule du lendemain, plan B)?

Croisement		Fille	
p = 1,000			
J6 Au cours des 12 derniers mois, combien de fois as-tu utilisé la contraception orale d'urgence (pilule du lendemain, plan B)?	0	348	87,4%
	1	41	10,3%
	2	5	1,3% **
	3	2	,5% **
	4	2	,5% **
Total		398	100,0%

Intervalle de confiance

Fille	
B. inf.	B. sup.
84,9%	89,9%
8,0%	12,6%
0,4%	2,1%
NA	NA
NA	NA

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

K1 Au cours des 30 derniers jours, as-tu fumé la cigarette, même si c'est juste quelques puffs?

Croisement		Sexe		Total
p = 0,319		Garçons	Filles	
K1 Au cours des 30 derniers jours, as-tu fumé la cigarette, même si c'est juste quelques puffs?	1 Non, je n'ai pas fumé la cigarette au cours des 30 derniers jours	583	756	1339
		89,7%	87,2%	88,3%
	2 Oui, à tous les jours	25	46	71
		3,8% *	5,3%	4,7%
3 Oui, presque à tous les jours	8	18	26	
	1,2% **	2,1% *	1,7% *	
4 Oui, durant quelques jours	34	47	81	
	5,2% *	5,4%	5,3%	
Total		650	867	1517
		100,0%	100,0%	100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
88,4%	91,0%	86,0%	88,4%	87,4%	89,2%	0,007
3,0%	4,7%	4,5%	6,1%	4,1%	5,3%	0,015
0,8%	1,7%	1,6%	2,6%	1,4%	2,1%	0,019
4,3%	6,2%	4,6%	6,2%	4,7%	6,0%	0,770

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

K1Rec Type de fumeurs (cigarette) au cours des 30 derniers jours

		Croisement		Total
		Sexe		
p = 0,218		Garçons	Filles	
K1Rec Type de fumeurs (cigarette)	1 Non-fumeurs	583 89,7%	756 87,3%	1339 88,3%
	2 Fumeurs occasionnels	34 5,2% *	47 5,4%	81 5,3%
	3 Fumeurs réguliers	33 5,1% *	63 7,3%	96 6,3%
Total		650 100,0%	866 100,0%	1516 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
88,4%	91,0%	86,1%	88,5%	87,4%	89,2%	0,009
4,3%	6,2%	4,6%	6,3%	4,7%	6,0%	0,763
4,1%	6,0%	6,3%	8,2%	5,6%	7,0%	0,001

K2 Au cours des 30 derniers jours, as-tu fumé le cigare, le cigarillo ou le petit cigare, même si c'est juste quelques puffs?

		Croisement		Total
		Sexe		
p = 0,031		Garçons	Filles	
K2 Au cours des 30 derniers jours, as-tu fumé le cigare, le cigarillo ou le petit cigare, même si c'est juste quelques puffs?	1 Non, je n'ai pas fumé le cigare, le cigarillo ou le petit cigare au cours des 30 derniers jours	544 83,4%	735 84,5%	1279 84,0%
	2 Oui, à tous les jours	10 1,5% **	3 ,3% **	13 ,9% **
	3 Oui, presque à tous les jours	2 ,3% **	11 1,3% **	13 ,9% **
	4 Oui, quelques jours	25 3,8% *	34 3,9% *	59 3,9%
	5 Oui, un ou deux jours	71 10,9%	87 10,0%	158 10,4%
Total		652 100,0%	870 100,0%	1522 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
81,8%	85,0%	83,2%	85,8%	83,0%	85,1%	0,324
1,0%	2,1%	NA	NA	0,6%	1,1%	NA
NA	NA	0,9%	1,7%	0,6%	1,1%	NA
3,0%	4,7%	3,2%	4,6%	3,3%	4,4%	0,895
9,5%	12,2%	8,9%	11,1%	9,5%	11,2%	0,315

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

K2Rec Type de fumeurs (cigarillo) au cours des 30 derniers jours

		Croisement		Total
		Sexe		
p = 0,845		Garçons	Fillles	
K2Rec Type de fumeurs (cigarillo)	1 Non-fumeurs	544 83,4%	735 84,5%	1279 84,0%
	2 Fumeurs occasionnels	96 14,7%	121 13,9%	217 14,3%
	3 Fumeurs réguliers	12 1,8% **	14 1,6% **	26 1,7% *
Total		652 100,0%	870 100,0%	1522 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
81,8%	85,0%	83,2%	85,8%	83,0%	85,1%	0,324
13,2%	16,3%	12,7%	15,2%	13,3%	15,2%	0,420
1,3%	2,4%	1,2%	2,1%	1,3%	2,1%	0,540

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

K3 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?

		Croisement		Total
		Sexe		
p = 0,000		Garçons	Fillles	
K3 Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence as-tu consommé (bu) de l'alcool?	0 Je n'ai pas consommé d'alcool au cours des 12 derniers mois	39 6,0% *	44 5,1%	83 5,5%
	1 Juste une fois, pour essayer	21 3,2% *	15 1,7% **	36 2,4% *
	2 Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	96 14,7%	188 21,7%	284 18,7%
	3 Environ 1 fois par mois	133 20,4%	208 24,0%	341 22,5%
	4 La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine	282 43,3%	377 43,5%	659 43,4%
	5 3 fois et plus par semaine MAIS pas tous les jours	78 12,0%	33 3,8% *	111 7,3%
6 Tous les jours	2 ,3% **	2 ,2% **	4 ,3% **	
Total		651 100,0%	867 100,0%	1518 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
5,0%	7,0%	4,3%	5,9%	4,8%	6,1%	0,169
2,5%	4,0%	1,3%	2,2%	1,9%	2,8%	0,001
13,2%	16,3%	20,2%	23,2%	17,6%	19,8%	0,000
18,7%	22,2%	22,4%	25,5%	21,3%	23,6%	0,003
41,2%	45,5%	41,7%	45,3%	42,0%	44,8%	0,908
10,6%	13,4%	3,1%	4,5%	6,6%	8,0%	0,000
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

K3Rec Fréquence de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois - Recodée

		Croisement		Total
		Sexe		
p = 0,006		Garçons	Filles	
K3Rec Fréquence de consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois - Recodée	0 Jamais	39 6,0% *	44 5,1%	83 5,5%
	1 Moins d'une fois/mois	118 18,1%	204 23,5%	322 21,2%
	2 Environ une fois/mois	133 20,4%	208 24,0%	341 22,4%
	3 Au moins une fois/sem.	362 55,5%	412 47,5%	774 50,9%
Total		652 100,0%	868 100,0%	1520 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
5,0%	7,0%	4,3%	5,9%	4,8%	6,1%	0,170
16,4%	19,8%	22,0%	25,0%	20,0%	22,3%	0,000
18,7%	22,1%	22,4%	25,5%	21,3%	23,6%	0,003
53,4%	57,7%	45,6%	49,3%	49,5%	52,3%	0,000

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

K4 Au cours des 12 derniers mois, combien de fois as-tu bu 5 consommations ou plus d'alcool dans une même occasion?

		Croisement		Total
		Sexe		
p = 0,000		Garçons	Filles	
K4 Au cours des 12 derniers mois, combien de fois as-tu bu 5 consommations ou plus d'alcool dans une même occasion?	1 Aucune	78 12,7%	135 16,4%	213 14,8%
	2 1 fois	49 8,0%	133 16,2%	182 12,7%
	3 2 fois	51 8,3%	106 12,9%	157 10,9%
	4 3 fois	53 8,6%	98 11,9%	151 10,5%
	5 4 fois	43 7,0%	57 6,9%	100 7,0%
	6 5 fois et plus	341 55,4%	293 35,6%	634 44,1%
Total		615 100,0%	822 100,0%	1437 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
11,1%	14,3%	15,0%	17,9%	13,7%	15,9%	0,001
6,7%	9,2%	14,7%	17,6%	11,7%	13,7%	0,000
7,0%	9,6%	11,6%	14,2%	10,0%	11,9%	0,000
7,3%	9,9%	10,6%	13,2%	9,6%	11,4%	0,000
5,8%	8,2%	5,9%	7,9%	6,2%	7,7%	0,943
53,1%	57,8%	33,7%	37,5%	42,6%	45,6%	0,000

K6 As-tu déjà consommé de l'alcool de façon régulière, c'est-à-dire au moins une fois par semaine pendant au moins un mois?

		Croisement		Total
		Sexe		
p = 0,000		Garçons	Filles	
K6 As-tu déjà consommé de l'alcool de façon régulière, c'est-à-dire au moins une fois par semaine pendant au moins un mois?	1 Oui	266 40,7%	225 25,9%	491 32,3%
	2 Non	388 59,3%	643 74,1%	1031 67,7%
Total		654 100,0%	868 100,0%	1522 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
38,6%	42,8%	24,3%	27,5%	31,0%	33,6%	0,000
57,2%	61,4%	72,5%	75,7%	66,4%	69,0%	0,000

K8a Au cours des 12 derniers mois, fréquence de consommation de : Cannabis (mari, pot, hachisch)

		Croisement		Total
		Sexe		
p = 0,000		Garçons	Filles	
K8a Au cours des 12 derniers mois, fréquence de consommation de : Cannabis (mari, pot, hachisch)	1 Je n'ai pas consommé	376 57,6%	540 62,0%	916 60,1%
	2 Juste une fois pour essayer	57 8,7%	93 10,7%	150 9,8%
	3 Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	78 11,9%	123 14,1%	201 13,2%
	4 Environ une fois par mois	44 6,7%	49 5,6%	93 6,1%
	5 La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine	46 7,0%	42 4,8% *	88 5,8%
	6 3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours	32 4,9% *	14 1,6% **	46 3,0%
	7 Tous les jours	20 3,1% *	10 1,1% **	30 2,0% *
Total		653 100,0%	871 100,0%	1524 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
55,4%	59,7%	60,2%	63,8%	58,7%	61,5%	0,002
7,5%	9,9%	9,6%	11,8%	9,0%	10,7%	0,021
10,5%	13,3%	12,9%	15,4%	12,2%	14,1%	0,024
5,7%	7,8%	4,8%	6,5%	5,4%	6,8%	0,111
5,9%	8,2%	4,0%	5,6%	5,1%	6,4%	0,001
4,0%	5,8%	1,2%	2,1%	2,5%	3,5%	0,000
2,3%	3,8%	0,8%	1,5%	1,6%	2,4%	0,000

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

K8b Au cours des 12 derniers mois, fréquence de consommation de : Cocaïne (coke, snow, crack, freebase, poudre)

Croisement

p = 0,688		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
K8b Au cours des 12 derniers mois, fréquence de consommation de : Cocaïne (coke, snow, crack, freebase, poudre)	1 Je n'ai pas consommé	623 95,6%	843 96,9%	1466 96,3%
	2 Juste une fois pour essayer	15 2,3% **	15 1,7% **	30 2,0% *
	3 Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	11 1,7% **	8 ,9% **	19 1,2% *
	4 Environ une fois par mois	1 ,2% **	1 ,1% **	2 ,1% **
	7 Tous les jours	2 ,3% **	3 ,3% **	5 ,3% **
Total		652 100,0%	870 100,0%	1522 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
94,7%	96,4%	96,3%	97,5%	95,8%	96,8%	0,016
1,7%	3,0%	1,3%	2,2%	1,6%	2,4%	0,160
1,1%	2,2%	0,6%	1,3%	0,9%	1,6%	0,022
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	0,2%	0,5%	NA

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

K8c Au cours des 12 derniers mois, fréquence de consommation de : Colle ou solvant

Croisement

p = 0,637		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
K8c Au cours des 12 derniers mois, fréquence de consommation de : Colle ou solvant	1 Je n'ai pas consommé	642 98,6%	861 99,1%	1503 98,9%
	2 Juste une fois pour essayer	4 ,6% **	3 ,3% **	7 ,5% **
	3 Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	2 ,3% **	2 ,2% **	4 ,3% **
	4 Environ une fois par mois	1 ,2% **	0 ,0% **	1 ,1% **
	5 La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine	1 ,2% **	0 ,0% **	1 ,1% **
	7 Tous les jours	1 ,2% **	3 ,3% **	4 ,3% **
Total		651 100,0%	869 100,0%	1520 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
98,1%	99,1%	98,7%	99,4%	98,6%	99,2%	0,141
NA	NA	NA	NA	0,3%	0,6%	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

K8d Au cours des 12 derniers mois, fréquence de consommation de : Hallucinogènes (LSD, PCP, MESS, champignons, acide, mescaline, ecstasy, buvard, etc.)

Croisement

p = 0,631		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
K8d Au cours des 12 derniers mois, fréquence de consommation de : Hallucinogènes (LSD, PCP, MESS, champignons, acide, mescaline, ecstasy, buvard, etc.)	1 Je n'ai pas consommé	572 87,7%	765 88,3%	1337 88,1%
	2 Juste une fois pour essayer	36 5,5% *	48 5,5%	84 5,5%
	3 Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	24 3,7% *	36 4,2% *	60 4,0%
	4 Environ une fois par mois	11 1,7% **	10 1,2% **	21 1,4% *
	5 La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine	7 1,1% **	3 ,3% **	10 ,7% **
	6 3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours	1 ,2% **	1 ,1% **	2 ,1% **
	7 Tous les jours	1 ,2% **	3 ,3% **	4 ,3% **
Total		652 100,0%	866 100,0%	1518 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
86,3%	89,2%	87,2%	89,5%	87,2%	89,0%	0,519
4,5%	6,5%	4,7%	6,4%	4,9%	6,2%	0,974
2,9%	4,5%	3,4%	4,9%	3,4%	4,5%	0,394
1,1%	2,2%	0,8%	1,5%	1,1%	1,7%	0,126
0,6%	1,5%	NA	NA	0,4%	0,9%	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

K8e Au cours des 12 derniers mois, fréquence de consommation de : Héroïne (smack)

Croisement

p = 0,205		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
K8e Au cours des 12 derniers mois, fréquence de consommation de : Héroïne (smack)	1 Je n'ai pas consommé	646 99,2%	863 99,2%	1509 99,2%
	2 Juste une fois pour essayer	0 ,0% **	2 ,2% **	2 ,1% **
	3 Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	0 ,0% **	1 ,1% **	1 ,1% **
	4 Environ une fois par mois	3 ,5% **	0 ,0% **	3 ,2% **
	5 La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine	1 ,2% **	1 ,1% **	2 ,1% **
	7 Tous les jours	1 ,2% **	3 ,3% **	4 ,3% **
Total		651 100,0%	870 100,0%	1521 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
98,9%	99,6%	98,9%	99,5%	99,0%	99,5%	0,886
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

K8f Au cours des 12 derniers mois, fréquence de consommation de : Amphétamines (speed, upper)

p = 0,712		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
K8f Au cours des 12 derniers mois, fréquence de consommation de : Amphétamines (speed, upper)	1 Je n'ai pas consommé	585 90,6%	785 90,5%	1370 90,5%
	2 Juste une fois pour essayer	22 3,4% *	28 3,2% *	50 3,3%
	3 Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	19 2,9% *	23 2,7% *	42 2,8% *
	4 Environ une fois par mois	8 1,2% **	15 1,7% **	23 1,5% *
	5 La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine	7 1,1% **	9 1,0% **	16 1,1% *
	6 3 fois ou plus par semaine MAIS pas tous les jours	4 ,6% **	2 ,2% **	6 ,4% *
	7 Tous les jours	1 ,2% **	5 ,6% **	6 ,4% **
Total		646 100,0%	867 100,0%	1513 100,0%

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
89,3%	91,8%	89,5%	91,6%	89,7%	91,4%	0,986
2,6%	4,2%	2,6%	3,9%	2,8%	3,8%	0,737
2,2%	3,7%	2,1%	3,2%	2,3%	3,2%	0,550
0,8%	1,7%	1,3%	2,2%	1,2%	1,9%	0,157
0,6%	1,5%	0,7%	1,4%	0,8%	1,3%	0,879
NA	NA	NA	NA	0,2%	0,6%	NA
NA	NA	0,3%	0,9%	0,2%	0,6%	NA

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

K8g Au cours des 12 derniers mois, fréquence de consommation de : Autres drogues ou médicaments pris sans prescription pour avoir un effet (valium, librium, dalmene, halcion, activan, ritalin, etc.)

Croisement

p = 0,417		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
K8g Au cours des 12 derniers mois, fréquence de consommation de : Autres drogues ou médicaments pris sans prescription pour avoir un effet (valium, librium, dalmene, halcion, activan, ritalin, etc.)	1 Je n'ai pas consommé	626 98,0%	830 97,4%	1456 97,7%
	2 Juste une fois pour essayer	3 ,5% **	12 1,4% **	15 1,0% **
	3 Moins d'une fois par mois (à l'occasion)	1 ,2% **	3 ,4% **	4 ,3% **
	4 Environ une fois par mois	3 ,5% **	3 ,4% **	6 ,4% **
	5 La fin de semaine OU 1 ou 2 fois par semaine	2 ,3% **	1 ,1% **	3 ,2% **
	7 Tous les jours	4 ,6% **	3 ,4% **	7 ,5% **
Total		639 100,0%	852 100,0%	1491 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
97,3%	98,6%	96,8%	98,0%	97,2%	98,1%	0,216
NA	NA	1,0%	1,9%	0,7%	1,3%	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	0,2%	0,6%	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	0,3%	0,7%	NA

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

K8aR Fréquence de consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois - Recodée

Croisement

p = 0,000		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
K8aR Fréquence de consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois - Recodée	1 Jamais	376 57,6%	540 62,0%	916 60,1%
	2 Moins d'une fois/mois	134 20,5%	216 24,8%	350 23,0%
	3 Environ une fois/mois	44 6,7%	49 5,6%	93 6,1%
	4 Au moins une fois/sem.	99 15,2%	66 7,6%	165 10,8%
Total		653 100,0%	871 100,0%	1524 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
55,4%	59,7%	60,2%	63,8%	58,7%	61,5%	0,002
18,8%	22,3%	23,2%	26,4%	21,8%	24,1%	0,000
5,7%	7,8%	4,8%	6,5%	5,4%	6,8%	0,111
13,6%	16,7%	6,6%	8,5%	10,0%	11,7%	0,000

K8bR Fréquence de consommation de cocaïne au cours des 12 derniers mois - Recodée

p = 0,587		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
K8bR Fréquence de consommation de cocaïne au cours des 12 derniers mois - Recodée	1 Jamais	623 95,6%	843 96,9%	1466 96,3%
	2 Moins d'une fois/mois	26 4,0% *	23 2,6% *	49 3,2%
	3 Environ une fois/mois	1 ,2% **	1 ,1% **	2 ,1% **
	4 Au moins une fois/sem.	2 ,3% **	3 ,3% **	5 ,3% **
Total		652 100,0%	870 100,0%	1522 100,0%

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
94,7%	96,4%	96,3%	97,5%	95,8%	96,8%	0,016
3,1%	4,8%	2,1%	3,2%	2,7%	3,7%	0,010
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	0,2%	0,5%	0,816

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

K8cR Fréquence de consommation de colle ou solvant au cours des 12 derniers mois - Recodée

p = 0,811		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
K8cR Fréquence de consommation de colle ou solvant au cours des 12 derniers mois - Recodée	1 Jamais	642 98,6%	861 99,0%	1503 98,8%
	2 Moins d'une fois/mois	6 ,9% **	6 ,7% **	12 ,8% **
	3 Environ une fois/mois	1 ,2% **	0 ,0% **	1 ,1% **
	4 Au moins une fois/sem.	2 ,3% **	3 ,3% **	5 ,3% **
Total		651 100,0%	870 100,0%	1521 100,0%

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
98,1%	99,1%	98,6%	99,3%	98,5%	99,1%	0,276
0,5%	1,3%	0,4%	1,0%	0,5%	1,0%	0,375
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	0,2%	0,5%	NA

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

K8dR Fréquence de consommation d'hallucinogènes au cours des 12 derniers mois - Recodée

p = 0,589		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
K8dR Fréquence de consommation d'hallucinogènes au cours des 12 derniers mois - Recodée	1 Jamais	572 87,6%	765 88,3%	1337 88,0%
	2 Moins d'une fois/mois	61 9,3%	84 9,7%	145 9,5%
	3 Environ une fois/mois	11 1,7% **	10 1,2% **	21 1,4% *
	4 Au moins une fois/sem.	9 1,4% **	7 ,8% **	16 1,1% *
Total		653 100,0%	866 100,0%	1519 100,0%

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
86,2%	89,0%	87,2%	89,5%	87,1%	88,9%	0,431
8,1%	10,6%	8,6%	10,8%	8,7%	10,4%	0,672
1,1%	2,2%	0,8%	1,5%	1,1%	1,7%	0,127
0,9%	1,9%	0,5%	1,1%	0,8%	1,3%	0,063

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

K8eR Fréquence de consommation d'héroïne au cours des 12 derniers mois - Recodée

p = 0,060		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
K8eR Fréquence de consommation d'héroïne au cours des 12 derniers mois - Recodée	1 Jamais	646 99,2%	863 99,2%	1509 99,2%
	2 Moins d'une fois/mois	0 ,0% **	3 ,3% **	3 ,2% **
	3 Environ une fois/mois	3 ,5% **	0 ,0% **	3 ,2% **
	4 Au moins une fois/sem.	2 ,3% **	4 ,5% **	6 ,4% **
Total		651 100,0%	870 100,0%	1521 100,0%

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
98,9%	99,6%	98,9%	99,5%	99,0%	99,5%	0,886
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	0,2%	0,6%	NA

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

K8fR Fréquence de consommation d'amphétamines au cours des 12 derniers mois - Recodée

Croisement				
p = 0,859		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
K8fR Fréquence de consommation d'amphétamines au cours des 12 derniers mois - Recodée	1 Jamais	585 90,7%	785 90,5%	1370 90,6%
	2 Moins d'une fois/mois	41 6,4% *	51 5,9%	92 6,1%
	3 Environ une fois/mois	8 1,2% **	15 1,7% **	23 1,5% *
	4 Au moins une fois/sem.	11 1,7% **	16 1,8% *	27 1,8% *
Total		645 100,0%	867 100,0%	1512 100,0%

Intervalle de confiance						
Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
89,4%	92,0%	89,5%	91,6%	89,8%	91,4%	0,855
5,3%	7,4%	5,0%	6,7%	5,4%	6,8%	0,499
0,8%	1,7%	1,3%	2,2%	1,2%	1,9%	0,159
1,1%	2,3%	1,4%	2,3%	1,4%	2,2%	0,716

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

K10 As-tu déjà consommé de la drogue de façon régulière, c'est-à-dire au moins une fois par semaine pendant au moins un mois?

Croisement				
p = 0,005		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
K10 As-tu déjà consommé de la drogue de façon régulière, c'est-à-dire au moins une fois par semaine pendant au moins un mois?	1 Oui	125 19,1%	119 13,7%	244 16,0%
	2 Non	528 80,9%	752 86,3%	1280 84,0%
Total		653 100,0%	871 100,0%	1524 100,0%

Intervalle de confiance						
Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
17,4%	20,8%	12,4%	14,9%	15,0%	17,0%	0,000
79,2%	82,6%	85,1%	87,6%	83,0%	85,0%	0,000

K13a J'ai eu des difficultés psychologiques à cause de ma consommation d'alcool ou de drogues (12 derniers mois)

Croisement

p = 0,241		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
K13a Au cours des 12 derniers mois : J'ai eu des difficultés psychologiques à cause de ma consommation d'alcool ou de drogues.	1 Oui	31 4,8% *	31 3,6% *	62 4,1%
	2 Non	618 95,2%	839 96,4%	1457 95,9%
Total		649 100,0%	870 100,0%	1519 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
3,8%	5,7%	2,9%	4,2%	3,5%	4,6%	0,038
94,3%	96,2%	95,8%	97,1%	95,4%	96,5%	0,038

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

K13b Ma consommation d'alcool ou de drogues a nuit à mes relations avec ma famille (12 derniers mois)

Croisement

p = 0,177		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
K13b Au cours des 12 derniers mois : Ma consommation d'alcool ou de drogues a nuit à mes relations avec ma famille.	1 Oui	25 3,9% *	22 2,5% *	47 3,1%
	2 Non	624 96,1%	848 97,5%	1472 96,9%
Total		649 100,0%	870 100,0%	1519 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
3,0%	4,7%	2,0%	3,1%	2,6%	3,6%	0,011
95,3%	97,0%	96,9%	98,0%	96,4%	97,4%	0,011

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

K13c Ma consommation d'alcool ou de drogues a nuit à une de mes amitiés ou à ma relation amoureuse (12 derniers mois)

Croisement

p = 0,003		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
K13c Au cours des 12 derniers mois : Ma consommation d'alcool ou de drogues a nuit à une de mes amitiés ou à ma relation amoureuse.	1 Oui	48 7,4%	33 3,8% *	81 5,3%
	2 Non	602 92,6%	835 96,2%	1437 94,7%
Total		650 100,0%	868 100,0%	1518 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
6,2%	8,5%	3,1%	4,5%	4,7%	6,0%	0,000
91,5%	93,8%	95,5%	96,9%	94,0%	95,3%	0,000

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

K13d J'ai eu des difficultés dans mes cours à cause de ma consommation d'alcool ou de drogues (12 derniers mois)

Croisement

p = 0,177		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
K13d Au cours des 12 derniers mois : J'ai eu des difficultés dans mes cours à cause de ma consommation d'alcool ou de drogues.	1 Oui	30 4,6% *	28 3,2% *	58 3,8%
	2 Non	620 95,4%	842 96,8%	1462 96,2%
Total		650 100,0%	870 100,0%	1520 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
3,7%	5,5%	2,6%	3,9%	3,3%	4,4%	0,014
94,5%	96,3%	96,1%	97,4%	95,6%	96,7%	0,014

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

K13e J'ai commis un geste délinquant (même si je n'ai pas été arrêté par la police) alors que j'avais consommé de l'alcool ou de la drogue (12 derniers mois)

Croisement

p = 0,000		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
K13e Au cours des 12 derniers mois : J'ai commis un geste délinquant (même si je n'ai pas été arrêté par la police) alors que j'avais consommé de l'alcool ou de la drogue.	1 Oui	69 10,6%	21 2,4% *	90 5,9%
	2 Non	583 89,4%	848 97,6%	1431 94,1%
Total		652 100,0%	869 100,0%	1521 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
9,2%	11,9%	1,9%	3,0%	5,3%	6,6%	0,000
88,1%	90,8%	97,0%	98,1%	93,4%	94,7%	0,000

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

K13f J'ai l'impression que les mêmes quantités d'alcool ou de drogues ont maintenant moins d'effet sur moi (12 derniers mois)

Croisement

p = 0,000		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
K13f Au cours des 12 derniers mois : J'ai l'impression que les mêmes quantités d'alcool ou de drogues ont maintenant moins d'effet sur moi.	1 Oui	99 15,2%	78 9,0%	177 11,6%
	2 Non	553 84,8%	791 91,0%	1344 88,4%
Total		652 100,0%	869 100,0%	1521 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
13,6%	16,7%	7,9%	10,0%	10,7%	12,5%	0,000
83,3%	86,4%	90,0%	92,1%	87,5%	89,3%	0,000

K13g J'ai parlé de ma consommation d'alcool ou de drogues à un intervenant (12 derniers mois)

Croisement

p = 0,375		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
K13g Au cours des 12 derniers mois : J'ai parlé de ma consommation d'alcool ou de drogues à un intervenant.	1 Oui	17 2,6% *	16 1,8% *	33 2,2% *
	2 Non	633 97,4%	849 98,2%	1482 97,8%
Total		650 100,0%	865 100,0%	1515 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
1,9%	3,3%	1,4%	2,3%	1,8%	2,6%	0,078
96,7%	98,1%	97,7%	98,6%	97,4%	98,2%	0,078

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

D2D3IMC Rec Classes de l'indice de masse corporelle (IMC) selon les points de coupure de Santé Canada

Croisement

p = 0,000		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
D2D3IMC Rec Classes de l'IMC selon Santé Canada	1 Poids insuffisant	67 10,2%	133 15,5%	200 13,2%
	2 Poids normal	438 66,8%	606 70,7%	1044 69,0%
	3 Excès de poids	123 18,8%	87 10,2%	210 13,9%
	4 Obésité, classe I	19 2,9% *	20 2,3% *	39 2,6% *
	5 Obésité, classe II	6 ,9% **	7 ,8% **	13 ,9% **
	6 Obésité, classe III	3 ,5% **	4 ,5% **	7 ,5% **
Total		656 100,0%	857 100,0%	1513 100,0%

Intervalle de confiance

Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
8,9%	11,5%	14,2%	16,9%	12,3%	14,2%	0,000
64,7%	68,8%	69,0%	72,4%	67,7%	70,3%	0,003
17,1%	20,4%	9,0%	11,3%	12,9%	14,9%	0,000
2,2%	3,6%	1,8%	2,9%	2,1%	3,0%	0,227
0,5%	1,3%	0,5%	1,2%	0,6%	1,1%	0,717
NA	NA	NA	NA	0,3%	0,7%	NA

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

D4a Chiffre correspondant le mieux à ton apparence actuelle (silhouette actuelle).

Croisement				
p = 0,000	Sexe		Total	
	Garçons	Filles		
D4a Chiffre correspondant le mieux à ton apparence actuelle.	Silhouette 1	2 ,3% **	15 1,7% **	17 1,1% *
	Silhouette 2	10 1,5% **	76 8,7%	86 5,6%
	Silhouette 3	40 6,0% *	166 19,0%	206 13,4%
	Silhouette 4	125 18,7%	204 23,4%	329 21,4%
	Silhouette 5	266 39,9%	194 22,2%	460 29,9%
	Silhouette 6	138 20,7%	125 14,3%	263 17,1%
	Silhouette 7	66 9,9%	70 8,0%	136 8,8%
	Silhouette 8	14 2,1% **	17 1,9% *	31 2,0% *
	Silhouette 9	6 ,9% **	6 ,7% **	12 ,8% **
Total	667 100,0%	873 100,0%	1540 100,0%	

Intervalle de confiance							p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total			
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.		
NA	NA	1,2%	2,2%	0,8%	1,4%	NA	
1,0%	2,0%	7,7%	9,7%	5,0%	6,2%	0,000	
5,0%	7,0%	17,6%	20,4%	12,4%	14,3%	0,000	
17,1%	20,4%	21,8%	24,9%	20,2%	22,5%	0,000	
37,8%	41,9%	20,7%	23,7%	28,6%	31,1%	0,000	
19,0%	22,4%	13,1%	15,6%	16,1%	18,1%	0,000	
8,6%	11,1%	7,0%	9,0%	8,1%	9,6%	0,020	
1,5%	2,7%	1,4%	2,4%	1,6%	2,4%	0,703	
0,5%	1,3%	0,4%	1,0%	0,5%	1,0%	0,400	

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

D4b Chiffre correspondant le mieux à comment tu aimerais être (silhouette souhaitée).

p = 0,000		Croisement		Total
		Sexe		
		Garçons	Filles	
D4b Chiffre correspondant le mieux à comment tu aimerais être.	Silhouette 1	4 ,6% **	24 2,7% *	28 1,8% *
	Silhouette 2	4 ,6% **	137 15,7%	141 9,2%
	Silhouette 3	8 1,2% **	260 29,8%	268 17,4%
	Silhouette 4	59 8,9%	275 31,5%	334 21,7%
	Silhouette 5	379 56,9%	148 17,0%	527 34,2%
	Silhouette 6	199 29,9%	25 2,9% *	224 14,6%
	Silhouette 7	10 1,5% **	4 ,5% **	14 ,9% **
	Silhouette 9	3 ,5% **	0 ,0% **	3 ,2% **
	Total		666 100,0%	873 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
NA	NA	2,2%	3,3%	1,5%	2,2%	NA
NA	NA	14,4%	17,0%	8,4%	10,0%	NA
0,7%	1,7%	28,1%	31,4%	16,4%	18,5%	0,000
7,7%	10,0%	29,8%	33,2%	20,6%	22,8%	0,000
54,8%	59,0%	15,6%	18,3%	32,9%	35,5%	0,000
28,0%	31,8%	2,3%	3,5%	13,6%	15,5%	0,000
1,0%	2,0%	NA	NA	0,7%	1,2%	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

IndD4 Indice d'insatisfaction de l'image corporelle (différence entre la silhouette actuelle et la silhouette souhaitée)

		Croisement		
		Sexe		Total
p = 0,000		Garçons	Filles	
IndD4 Indice d'insatisfaction de l'image corporelle	-8 Aspirant à maigrir	1 ,2% **	0 ,0% **	1 ,1% **
	-7	0 ,0% **	2 ,2% **	2 ,1% **
	-5	0 ,0% **	3 ,3% **	3 ,2% **
	-4	3 ,5% **	10 1,1% **	13 ,8% **
	-3	6 ,9% **	48 5,5%	54 3,5%
	-2	35 5,3% *	161 18,5%	196 12,8%
	-1	139 20,9%	315 36,2%	454 29,5%
	0 Satisfaits	273 41,0%	282 32,4%	555 36,1%
	1	148 22,2%	34 3,9% *	182 11,8%
	2	51 7,7%	16 1,8% *	67 4,4%
	3	8 1,2% **	0 ,0% **	8 ,5% **
	4	1 ,2% **	0 ,0% **	1 ,1% **
	5	1 ,2% **	0 ,0% **	1 ,1% **
Total		666 100,0%	871 100,0%	1537 100,0%

Intervalle de confiance							p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total			
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.		
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
NA	NA	0,8%	1,5%	0,6%	1,1%	NA	
0,5%	1,3%	4,7%	6,3%	3,0%	4,0%	0,000	
4,3%	6,2%	17,1%	19,9%	11,8%	13,7%	0,000	
19,2%	22,6%	34,4%	37,9%	28,3%	30,8%	0,000	
38,9%	43,1%	30,7%	34,1%	34,8%	37,4%	0,000	
20,5%	24,0%	3,2%	4,6%	11,0%	12,7%	0,000	
6,5%	8,8%	1,4%	2,3%	3,8%	4,9%	0,000	
0,7%	1,7%	NA	NA	0,3%	0,7%	NA	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

IndD4R Indice d'insatisfaction de l'image corporelle - recodé

p = 0,000				Croisement		Total
		Sexe		Garçons	Filles	
						Garçons
IndD4R Indice d'insatisfaction de l'image corporelle - recodé	-1 Aspirent à maigrir	184	539	27,6%	62,0%	723 47,1%
	0 Satisfaits	273	282	41,0%	32,4%	555 36,1%
	1 Aspirent à engraisser	209	49	31,4%	5,6%	258 16,8%
Total		666	870	100,0%	100,0%	1536 100,0%

Intervalle de confiance							p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total			
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.		
25,8%	29,5%	60,2%	63,7%	45,7%	48,4%	0,000	
38,9%	43,1%	30,7%	34,1%	34,8%	37,5%	0,000	
29,4%	33,3%	4,8%	6,5%	15,8%	17,8%	0,000	

D5a Méthodes essayées au cours des 6 derniers mois pour perdre ou contrôler le poids : Suivre une diète

p = 0,000				Croisement		Total
		Sexe		Garçons	Filles	
						Garçons
D5a Suivre une diète	1 Souvent	12	17	1,8% **	1,9% *	29 1,9% *
	2 Quelques fois	12	60	1,8% **	6,8%	72 4,6%
	3 Rarement	17	69	2,5% *	7,8%	86 5,5%
	4 Jamais	631	733	93,9%	83,4%	1364 87,9%
Total		672	879	100,0%	100,0%	1551 100,0%

Intervalle de confiance							p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total			
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.		
1,2%	2,3%	1,4%	2,4%	1,5%	2,2%	0,692	
1,2%	2,3%	5,9%	7,7%	4,1%	5,2%	0,000	
1,9%	3,2%	6,9%	8,8%	4,9%	6,2%	0,000	
92,9%	94,9%	82,1%	84,7%	87,1%	88,8%	0,000	

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

D5b Méthodes essayées au cours des 6 derniers mois pour perdre ou contrôler le poids : Ne pas manger pendant toute une journée

		Croisement		
		Sexe		Total
p = 0,000		Garçons	Filles	
D5b Ne pas manger pendant toute une journée	1 Souvent	9 1,3% **	25 2,8% *	34 2,2% *
	2 Quelques fois	9 1,3% **	44 5,0%	53 3,4%
	3 Rarement	19 2,8% *	88 10,0%	107 6,9%
	4 Jamais	634 94,5%	722 82,1%	1356 87,5%
Total		671 100,0%	879 100,0%	1550 100,0%

Intervalle de confiance							p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total			
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.		
0,9%	1,8%	2,3%	3,4%	1,8%	2,6%	0,000	
0,9%	1,8%	4,2%	5,8%	2,9%	3,9%	0,000	
2,1%	3,5%	8,9%	11,1%	6,2%	7,6%	0,000	
93,5%	95,4%	80,8%	83,5%	86,6%	88,4%	0,000	

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

D5c Méthodes essayées au cours des 6 derniers mois pour perdre ou contrôler le poids : Prendre des laxatifs

		Croisement		
		Sexe		Total
p = 0,034		Garçons	Filles	
D5c Prendre des laxatifs	1 Souvent	7 1,0% **	8 ,9% **	15 1,0% **
	2 Quelques fois	0 ,0% **	8 ,9% **	8 ,5% **
	3 Rarement	3 ,4% **	10 1,1% **	13 ,8% **
	4 Jamais	661 98,5%	851 97,0%	1512 97,7%
Total		671 100,0%	877 100,0%	1548 100,0%

Intervalle de confiance							p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total			
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.		
0,6%	1,5%	0,6%	1,3%	0,7%	1,2%	0,635	
NA	NA	0,6%	1,3%	0,3%	0,7%	NA	
NA	NA	0,8%	1,5%	0,6%	1,1%	NA	
98,0%	99,0%	96,4%	97,6%	97,3%	98,1%	0,000	

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

D5d Méthodes essayées au cours des 6 derniers mois pour perdre ou contrôler le poids : Prendre des coupe-faim

		Croisement		Total
		Sexe		
p = 0,021		Garçons	Filles	
D5d Prendre des coupe-faim	1 Souvent	7 1,0% **	9 1,0% **	16 1,0% *
	2 Quelques fois	2 ,3% **	12 1,4% **	14 ,9% **
	3 Rarement	4 ,6% **	16 1,8% *	20 1,3% *
	4 Jamais	657 98,1%	840 95,8%	1497 96,8%
Total		670 100,0%	877 100,0%	1547 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
0,6%	1,5%	0,7%	1,4%	0,8%	1,3%	0,948
NA	NA	1,0%	1,8%	0,6%	1,2%	NA
NA	NA	1,3%	2,3%	1,0%	1,6%	NA
97,5%	98,6%	95,1%	96,5%	96,3%	97,2%	0,000

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

D5e Méthodes essayées au cours des 6 derniers mois pour perdre ou contrôler le poids : Diminuer, réduire ou couper le sucre, le gras

		Croisement		Total
		Sexe		
p = 0,000		Garçons	Filles	
D5e Diminuer, réduire ou couper le sucre, le gras	1 Souvent	60 8,9%	178 20,3%	238 15,4%
	2 Quelques fois	125 18,6%	319 36,3%	444 28,7%
	3 Rarement	74 11,0%	132 15,0%	206 13,3%
	4 Jamais	412 61,4%	249 28,4%	661 42,7%
Total		671 100,0%	878 100,0%	1549 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
7,8%	10,1%	18,8%	21,7%	14,4%	16,3%	0,000
17,0%	20,2%	34,6%	38,1%	27,4%	29,9%	0,000
9,7%	12,3%	13,8%	16,3%	12,4%	14,2%	0,000
59,4%	63,4%	26,7%	30,0%	41,3%	44,0%	0,000

D5f Méthodes essayées au cours des 6 derniers mois pour perdre ou contrôler le poids : T'entraîner de façon intensive

		Croisement		Total
		Sexe		
p = 0,000		Garçons	Filles	
D5f T'entraîner de façon intensive	1 Souvent	139 20,7%	105 12,0%	244 15,8%
	2 Quelques fois	111 16,5%	164 18,7%	275 17,8%
	3 Rarement	108 16,1%	224 25,6%	332 21,4%
	4 Jamais	314 46,7%	383 43,7%	697 45,0%
Total		672 100,0%	876 100,0%	1548 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
19,0%	22,4%	10,8%	13,2%	14,8%	16,7%	0,000
15,0%	18,1%	17,3%	20,1%	16,7%	18,8%	0,037
14,6%	17,6%	24,0%	27,1%	20,3%	22,6%	0,000
44,7%	48,8%	41,9%	45,5%	43,7%	46,4%	0,030

D5g Méthodes essayées au cours des 6 derniers mois pour perdre ou contrôler le poids : Commencer ou recommencer à fumer

		Croisement		Total
		Sexe		
p = 0,109		Garçons	Filles	
D5g Commencer ou recommencer à fumer	1 Souvent	7 1,0% **	23 2,6% *	30 1,9% *
	2 Quelques fois	11 1,6% **	9 1,0% **	20 1,3% *
	3 Rarement	14 2,1% **	19 2,2% *	33 2,1% *
	4 Jamais	636 95,2%	826 94,2%	1462 94,6%
Total		668 100,0%	877 100,0%	1545 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
0,6%	1,5%	2,1%	3,2%	1,6%	2,3%	0,000
1,1%	2,2%	0,7%	1,4%	1,0%	1,6%	0,058
1,5%	2,7%	1,6%	2,7%	1,7%	2,5%	0,861
94,3%	96,1%	93,3%	95,0%	94,0%	95,2%	0,100

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

D5h Méthodes essayées au cours des 6 derniers mois pour perdre ou contrôler le poids : Sauter des repas

		Croisement		Total
		Sexe		
p = 0,000		Garçons	Filles	
D5h Sauter des repas	1 Souvent	35 5,2% *	107 12,2%	142 9,2%
	2 Quelques fois	61 9,1%	129 14,7%	190 12,3%
	3 Rarement	66 9,8%	139 15,8%	205 13,2%
	4 Jamais	509 75,9%	503 57,3%	1012 65,3%
Total		671 100,0%	878 100,0%	1549 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
4,3%	6,1%	11,0%	13,4%	8,4%	9,9%	0,000
7,9%	10,3%	13,4%	16,0%	11,4%	13,2%	0,000
8,6%	11,1%	14,5%	17,1%	12,3%	14,2%	0,000
74,1%	77,6%	55,5%	59,1%	64,0%	66,6%	0,000

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

D5i Méthodes essayées au cours des 6 derniers mois pour perdre ou contrôler le poids : Te faire vomir après un repas

		Croisement		Total
		Sexe		
p = 0,003		Garçons	Filles	
D5i Te faire vomir après un repas	1 Souvent	4 ,6% **	9 1,0% **	13 ,8% **
	2 Quelques fois	2 ,3% **	11 1,3% **	13 ,8% **
	3 Rarement	4 ,6% **	21 2,4% *	25 1,6% *
	4 Jamais	661 98,5%	833 95,3%	1494 96,7%
Total		671 100,0%	874 100,0%	1545 100,0%

Intervalle de confiance						p-value (SIG)
Garçon		Fille		Total		
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
NA	NA	0,7%	1,4%	0,6%	1,1%	NA
NA	NA	0,9%	1,7%	0,6%	1,1%	NA
NA	NA	1,9%	3,0%	1,3%	2,0%	NA
98,0%	99,0%	94,5%	96,1%	96,2%	97,2%	0,000

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

D5j Méthodes essayées au cours des 6 derniers mois pour perdre ou contrôler le poids : Autre

Croisement				
p = 0,024		Sexe		Total
		Garçons	Filles	
D5j Autre	1 Souvent	12 5,2% **	15 7,9% *	27 6,4% *
	2 Quelques fois	1 ,4% **	8 4,2% **	9 2,1% **
	3 Rarement	1 ,4% **	1 ,5% **	2 ,5% **
	4 Jamais	216 93,9%	166 87,4%	382 91,0%
Total		230 100,0%	190 100,0%	420 100,0%

Intervalle de confiance						
Garçon		Fille		Total		p-value (SIG)
B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	B. inf.	B. sup.	
2,7%	7,7%	4,4%	11,4%	4,3%	8,5%	0,225
NA	NA	1,6%	6,8%	0,9%	3,4%	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
91,2%	96,6%	83,0%	91,7%	88,5%	93,4%	0,012

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise

D5jAut Autres méthodes essayées au cours des 6 derniers mois pour perdre ou contrôler le poids

Croisement			
	Sexe		Total
	Garçons	Filles	
Entrainement régulier/normal	6	12	18
Manger sainement	2	3	5
Diminuer les portions	0	3	3
Manger plus	1	1	2
Amphétamines, speed pour couper l'appétit	0	2	2
Stéroïdes	2	0	2

Caractéristiques liées au sommeil des collégiens (scores moyens)

	n	Moyenne	Écart type	Erreur type	Intervalle de confiance		Coefficient de variation	p-value (Sig)	
					B. inf.	B. sup.			
I2aR Heure du coucher la semaine (1h=25h)	Garçon	646	23,17	,98	,04	23,10	23,25	4,2%	0,000
	Fille	867	22,73	,98	,03	22,66	22,80	4,3%	
	Total	1513	22,92	1,00	,03	22,87	22,97	4,4%	
I2bR Heure du coucher la fin de semaine (1h=25h)	Garçon	643	25,45	1,60	,06	25,32	25,57	6,3%	0,000
	Fille	863	25,01	1,61	,05	24,91	25,12	6,4%	
	Total	1505	25,20	1,62	,04	25,12	25,28	6,4%	
I2I3aDureeSem Durée du sommeil la semaine	Garçon	643	7,95	1,11	,04	7,86	8,04	14,0%	0,001
	Fille	864	8,13	1,12	,04	8,06	8,21	13,7%	
	Total	1507	8,06	1,12	,03	8,00	8,11	13,9%	
I2I3bDureeFds Durée du sommeil la fin de semaine	Garçon	638	8,60 *	1,86	,07	8,46	8,75	21,6%	0,010
	Fille	859	8,84 *	1,64	,06	8,73	8,95	18,6%	
	Total	1497	8,74 *	1,74	,04	8,65	8,82	19,9%	
SommeilRat Heures de sommeil de rattrapage la fin de semaine	Garçon	634	,66 **	2,02	,08	,50	,81	308,0%	0,697
	Fille	856	,69 **	1,79	,06	,57	,81	257,2%	
	Total	1490	,68 **	1,89	,05	,58	,77	278,6%	
DiffHrsCoucher Délai de l'heure du coucher la fin de semaine	Garçon	642	2,26 **	1,49	,06	2,15	2,38	66,0%	0,798
	Fille	861	2,28 **	1,45	,05	2,19	2,38	63,5%	
	Total	1502	2,28 **	1,47	,04	2,20	2,35	64,6%	

* Coefficient de variation entre 15% et 25%; interpréter avec prudence

** Coefficient de variation supérieur à 25%; estimation imprécise